

方正教育护士资格考前一小时速记

考点 1：锐器伤的紧急处理

立即从伤口近心端向远心端挤压，禁止伤口局部按压；肥皂水、流动水反复冲洗伤口，等渗盐水冲洗黏膜；用0.5%碘伏或75%乙醇消毒伤口，并包扎。

考点 2：温度

一般病房温度18~22°C；
婴儿室、手术室、产房、老年病室、ICU、CCU22~24°C；
早产儿病室24~26°C；鼻饲液38~40°C；
乙醇擦浴30°C；温水擦浴32~34°C

考点 3：卧位

急性肺水肿、心包积液、支气管哮喘发作端坐卧位；休克病人中凹卧位；
昏迷或全身麻醉未清醒病人去枕仰卧位；
心肺疾患引起呼吸困难半坐卧位；
阿米巴痢疾灌肠右侧卧位；
产褥感染病人半卧位或抬高床头；
空气栓塞左侧卧位头低足高位；
腹外疝术后平卧位膝下垫软枕

考点 4：病历排序

入院病历排序首页是体温单
出院病历排序首页是住院病历首页、最后是医嘱单体温单

考点 5：常考病人饮食护理

高蛋白、高热量饮食：甲亢、结核病、烧伤等病人
低盐饮食：急慢性肾炎、心脏病、肝硬化腹水、
重度高血压但水肿较轻病人，食盐量<2g/d
少渣饮食：伤寒、痢疾、腹泻、肠炎、食管-胃底
静脉曲张的病人
隐血试验饮食：试验前3天禁食肉类、动物血、
肝脏、含铁剂药物及绿色蔬菜
甲状腺¹³¹I试验饮食：试验期2周期间禁食含碘食
物，如海带、紫菜、虾、鱼、加碘食盐等

考点 6：尿量

多尿24小时尿量>2500ml；
少尿24小时尿量<400ml或每小时尿量<17ml；
无尿或尿闭24小时尿量<100ml或12小时内无尿

考点 7：注射角度

皮内注射ID：5°；皮下注射H：30~40°；
肌内注射IM：90°；静脉注射IV：15~30°

考点 8：常用防腐剂的使用

甲醛艾迪计数、管型、细胞检查浓盐酸
甲苯尿蛋白定量、尿糖定量及钾、钠、氯、肌酐、
肌酸定量

10%甲醛溶液或95%乙醇溶液固定痰标本，查找癌细胞

考点 9：常考输液反应提示词

急性肺水肿-咳粉红色泡沫痰、呼吸困难（循环负
荷过）；静脉炎-条索状红线
空气栓塞-胸骨后疼痛、水泡音、呼吸困难

考点 10：洋地黄中毒表现及处理

胃肠道（最早出现）食欲下降、恶心、呕吐等
神经系统视力模糊、黄视绿视等
心血管各种心律失常最常见为室性期前收缩
处理措施立即停用洋地黄类药；停用排钾利尿剂
(如呋塞米、氢氯噻嗪)

考点 11：心衰的表现

左心衰肺循环瘀血（最早出现劳力性呼吸困难）；
右心衰竭体循环静脉淤血（早期在身体的下垂部
位和组织疏松部位，出现凹陷性水肿）

考点 12：哮喘用药：控制哮喘急性发作首选沙丁胺 醇；预防哮喘首选色甘酸钠

考点 13：心功能分级

I级日常活动不受限
II级一般活动可出现心衰症状
III级低于平时一般活动量
IV级休息状态也存在心衰相关症状

考点 14：消化道溃疡是上消化道出血最常见的病因

考点 15：少量咯血为<100ml/d；

中量咯血为100~500ml/d；
大量咯血为>500ml/d或1次咯血量>100ml

考点 16：消化性溃疡疼痛规律

胃溃疡进食-疼痛-缓解
十二指肠溃疡疼痛-进食-缓解

考点 17：胃十二指肠常见并发症提示

穿孔-腹膜刺激征（X线可见膈下游离气体）
大出血-大量呕血，柏油样便
瘢痕性幽门梗阻-吐隔夜素食吐后不缓解

考点 18：碳酸氢钠总结

煮沸消毒加入1%~2%碳酸氢钠可提高沸点去污防锈；
1%~4%碳酸氢钠漱口用于口腔真菌感染；
敌百虫农药中毒禁用碳酸氢钠；
乐果中毒用2%~4%碳酸氢钠洗胃

考点 19：胸部损伤患者的现场急救

多根多处肋骨骨折—加压包扎；
开放性气胸—封闭伤口；
张力性气胸—穿刺放气

考点 20：急性心肌梗死患者24h内不宜应用洋地黄 制剂，应用吗啡时注意观察患者有无呼吸抑制。

考点 21: 预产期的推算按末次月经 (LMP) 第一日算起, 月份减3或加9, 日数加7

考点 22: 间歇性低流量吸氧 慢性肺心病缓解期、睡眠呼吸暂停低通气综合征 (OSAHS)

持续低流量吸氧 COPD、慢性心功能不全、II型呼吸衰竭

高流量吸氧 急性低氧性呼吸衰、心源性肺水肿

高压吸氧 CO 中毒

考点 23: 妊娠 35 周前的早产者, 在分娩前遵医嘱给予孕妇糖皮质激素促胎肺成熟

考点 24: 心开窍于舌, 肝开窍于目, 脾开窍于口, 肺开窍于鼻, 肾开窍于耳和二阴

考点 25: 保护性隔离人群早产儿, 严重烧伤, 白血病, 器官移植, 免疫缺陷病人

考点 26: 异位妊娠中以输卵管 **壶腹部** 最多见; 主要表现停经、腹痛、阴道流血和休克; 后穹隆穿刺是一种简单可靠的诊断方法

考点 27: 胎盘早剥主要症状突然发生的**持续性腹部疼痛**; 检查子宫硬如板状, 有压痛

考点 28: 前置胎盘主要症状妊娠晚期或临产时, 发生无诱因、无痛性反复**阴道流血**

考点 29: 产后出血治疗原则

子宫收缩乏力**按摩**; 软产道裂伤缝合;

胎膜残留“刮胎盘植入“切”; 胎盘嵌顿“麻”

考点 30: 烧伤面积速记口诀 3、3、3 (头、面、颈), 5、6、7 (双手、双前臂、双上臂), 5、7、13、21 (双臂、双足、双小腿、双大腿), 13、13 (躯干), 会阴 1

考点 31: 烧伤计算

伤后第 1 个 24h 补液=烧伤面积×体重×1.5 (儿童为 1.8, 婴儿为 2) +2000 (生理需求量)

考点 32: 颅底骨折表现

颅前窝熊猫眼或眼睛征, 鼻漏, 损伤嗅神经;

颅中窝耳漏, 损伤面神经、听神经;

颅后窝 Battle 征, 损伤脑神经

考点 33: 冷疗的禁忌部位: 枕后, 耳廓, 阴囊, 心前区, 腹部, 足底

考点 34: 空腔脏器破裂表现为持续性剧烈腹痛、腹膜刺激征、肝浊音界缩小或消失, X 线示膈下游离气体

考点 35: 常考呼吸气味的改变

恶臭味**支气管扩张或肺脓肿患者**;

烂苹果味**糖尿病酮症酸中毒患者**;

刺激性大蒜味**有机磷农药中毒患者**

考点 36: 热射病又称中暑高热, 以高热、无汗、意

识障碍“三联征”为典型表现

考点 37: 破伤风患者最先受影响的肌群是**咀嚼肌**

考点 38: 常考内痔分期简单记

II 度-有便血, 脱出后自行回纳

III 度-便血少, 脱出后需手托回

考点 39: 食管癌以**中胸段**多见;

早期出现食物哽噎感、停滞感或异物感;

中晚期典型症状为进行性吞咽困难

考点 40: 幽门螺杆菌四联疗法: 奥美拉唑+克拉霉素+阿莫西林+枸橼酸铋钾

考点 41: 肝癌

肝区疼痛为原发性肝癌最常见和最主要症状;

肝大是中晚期肝癌的主要临床体征;

甲胎蛋白 (AFP) 测定是目前诊断原发性肝癌最常用、最重要的方法;

肝癌患者禁用肥皂水灌肠, 以免诱发肝性脑病

考点 42: 甲状腺病人术前服用碘剂作用抑制甲状腺激素的释放, 减少甲状腺血流

考点 43: 房颤与室颤处理房颤首选药**抗凝药华法林**急性期同步电复律; 室颤立即非同步电复律

考点 44: 乳腺癌皮肤改变

淋巴管被癌细胞堵塞时, 皮肤呈“橘皮样”改变侵犯 Cooper 韧带, 皮肤表面凹陷, 称为“酒窝征”

考点 45: 瞳孔异常见于

双侧瞳孔缩小**有机磷农药、吗啡、氯丙嗪**

双侧瞳孔扩大**颅内压增高、颅脑损伤、颠茄类药物中毒等(大压颞);**

单侧瞳孔缩小**同侧小脑幕裂孔疝早期→先小后大**

考点 46: 宫颈癌辅助检查宫颈刮片细胞学检查普查; 宫颈和宫颈管活组织检查确诊

考点 47: 滴速和时间的计算

每分钟滴数=(液体总量 ml ×点滴系数) / 输液时间 min

输液时间=(液体总量 ml ×点滴系数) / (每分钟滴数 × 60min)

考点 48: 皮下脂肪消耗的顺序依次: 腹部、躯干、臀部、四肢, 最后是面部

考点 49: 小儿预防接种出生乙肝卡介苗, 二月脊灰炎正好, 三四五月百日破, 八月麻疹岁乙脑

考点 50: 先天性心脏病

左向右分流 (潜伏青紫型) 室间隔缺损, 房间隔缺损, 动脉导管未闭;

右向左分流 (青紫型) 法洛四联症

方正教育各分校联系方式

郑州: 18237825053

济源: 18639133934

新乡: 15090090956

焦作: 18539167140

三门峡: 18739880171

开封: 15093696910

周口: 15518190506

安阳: 15517228822

许昌: 17603744443

全国加盟

濮阳: 18236032199

商丘: 18337007705

鹤壁: 15517228822

平顶山: 15886765753

胡老师: 17837886667