



临床执业（含助理）医师笔试

考前（临床）
100 题



多看一题



多考一分

主编 方正医考教研室

方正教育
FZ EDUCATION



扫码获取分校联系方式



关注“方正网校”获取更多资讯

全国加盟：胡老师 17837886667

临床执业（含助理）医师资格考试

考前 100 题

1. 女，24 岁，间断憋喘 10 天，加重 2 天来就诊。给予糖皮质激素、 β_2 受体激动剂、氨茶碱治疗后有好转，出院后肺功能检查正常。对于该患者的长期治疗，首选

- A. 吸入激素联合吸入长效 β_2 受体激动剂
- B. 短效 β_2 受体激动剂
- C. 长效 M 受体激动剂
- D. 口服糖皮质激素
- E. 口服糖皮质激素联合长效 β_2 受体激动剂

方正医学网答案：A

2. 男，52 岁，突发呼吸困难 4 小时。既往糖尿病、高血压病史 10 年。查体：R32 次/分，BP100/70mmHg，颈静脉怒张，双肺呼吸音清，未闻及干湿啰音。心率 105 次/分， $P_2 > A_2$ ，行 CTPA 示右下肺动脉内充盈缺损。宜采取的治疗措施首选

- A. 口服华法林

- B. 静注 rt-PA
- C. 肺动脉内注射尿激酶
- D. 皮下注射低分子肝素
- E. 手术取栓

方正医学网答案：D

3. 男，25 岁，右胸刺伤 1 小时。查体：P120 次/分，R30 次/分，BP75/45mmHg。右侧锁骨中线第 5 肋间可以见一长约 1cm 伤口。胸腔闭式引流首次引流出 800ml 血液，半小时后引流出 300ml 血液。最适宜的治疗方法是

- A. 立即开胸探查止血
- B. 继续胸腔闭式引流
- C. 高浓度吸氧
- D. 大量输血+止血药
- E. 大量补液

方正医学网答案：A

4. 男，68 岁，咳嗽气促 1 天，既往诊断为 COPD，肺心病。血气分析：pH7.188， $PaCO_2$ 75mmHg，

PaO₂50mmHg, BE-5mmol/L。最可能的酸碱失衡类型是

- A. 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒
- B. 单纯呼吸性酸中毒
- C. 单纯代谢性酸中毒
- D. 单纯代谢性碱中毒
- E. 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒

方正医学网答案：E

5. 男，75 岁，突发呼吸困难 6 小时，咳粉红色泡沫痰。查体：口唇发绀，端坐呼吸，双肺底布满湿啰音。该患者端坐呼吸可以缓解症状的机制是

- A. 改善肺顺应性
- B. 改善心肌顺应性
- C. 降低气道阻力
- D. 减少前负荷
- E. 减少后负荷

方正医学网答案：D

6. 女，65 岁。持续胸痛 6 小时，伴呼吸困难，不敢活动。查体：BP150/70mmHg，双肺底可闻及少量湿啰音，心率 104 次/分，

律齐。心电图示 I、aVL、V₁~V₆导联 ST 段抬高约 0.2~0.6mV。

心功能分级是

- A. Killip 分级 II 级
- B. NYHA 分级 II 级
- C. Killip 分级 III 级
- D. 前临床心衰阶段
- E. NYHA 分级 III 级

方正医学网答案：A

7. 男，56 岁，血压升高 3 年，呼吸困难 1 周，加重 1 天。患者 1 周前无明显诱因出现活动时喘憋，1 天前出现呼吸困难，端坐呼吸，伴大汗，有高血压家族史。查体：P100 次/分，BP230/150mmHg，双肺可闻及中小水泡音，心率 100 次/分，律齐，未闻及杂音，双下肢不肿。心电图提示左室肥厚劳损。患者目前的情况为

- A. 高血压急症
- B. 高血压亚急症
- C. 顽固性高血压
- D. 高血压危象
- E. 恶性高血压

方正医学网答案：A

8. 男，50 岁。劳累时胸痛 2 年，每天上 3 层楼梯时症状发作，含服硝酸甘油 1~3min 可缓解。既往高血压病史 5 年，糖尿病病史 4 年。可改善该患者预后的治疗措施是

- A. 冠状动脉支架植入术
- B. 皮下注射低分子肝素
- C. 长期口服营养心肌类药物
- D. 冠状动脉旁路移植术
- E. 长期口服他汀类药物

方正医学网答案：E

9. 女，43 岁。诊断风湿性心脏瓣膜病 20 余年。查体：心前区未触及震额，胸骨左缘第 3 肋间可闻及舒张期叹气样杂音，心尖部可闻及舒张早中期杂音， S_1 减弱。最可能的诊断是

- A. 主动脉瓣关闭不全伴二尖瓣器质性狭窄
- B. 主动脉瓣关闭不全伴二尖瓣相对性狭窄
- C. 主动脉瓣器质性狭窄伴二尖瓣器质性狭窄
- D. 主动脉瓣相对性狭窄伴二尖

瓣相对性狭窄

E. 主动脉瓣相对性狭窄伴二尖瓣器质性狭窄

方正医学网答案：B

10. 女，50 岁，面色苍白、月经过多 2 个月。查体：贫血貌，四肢皮肤散在出血点，心肺检查无异常，肝脾肋下未触及。

实验室检查：血常规：Hb60g/L，WBC $2.9 \times 10^9/L$ ，Plt $12 \times 10^9/L$ 。

分别在髂前及髂后上棘行骨髓穿刺涂片见有核细胞少，成熟淋巴细胞多见，胸骨穿刺涂片见骨髓增生尚活跃，粒、红二系成熟停滞于晚期阶段，全片未见巨核细胞。最可能诊断是

- A. 巨幼细胞贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 急性白血病
- D. 缺铁性贫血
- E. 特发性血小板减少性紫癜

方正医学网答案：B

11. 女，25 岁。发热伴下肢、腹部皮肤瘀斑 5 天。查体：双下肢和腹部皮肤有多处瘀斑，双

侧颈部、腋窝和腹股沟可触及淋巴结肿大，活动无压痛，最大者为 $2.0\text{cm} \times 2.5\text{cm}$ ，胸骨压痛(+)。腹软，肝肋下 1.5cm ，脾肋下 2cm 。化验：Hb 78g/L ，WBC $18 \times 10^9/\text{L}$ ，分类可见原始和幼稚细胞，PLT $25 \times 10^9/\text{L}$ ，网织红细胞 0.002 。明确诊断后，首选的治疗措施是

- A. CHOP 方案化疗
- B. DA 方案化疗
- C. 给予大剂量糖皮质激素
- D. DVLV 方案化疗
- E. ABVD 方案化疗

方正医学网答案：D

12. 男，56 岁，右侧颈部淋巴结肿大 3 个月，发热 1 个月。查体：T 38.8°C ，双侧腹股沟淋巴结肿大，颈部淋巴结活检提示弥漫大 B 细胞淋巴瘤。患者的分期为

- A. II 期 A
- B. III 期 B
- C. I 期 A
- D. II 期 B
- E. IV 期 A

方正医学网答案：B

13. 女，50 岁，非重型再生障碍性贫血，曾经有多次输血过敏反应，皮肤出现大片风团和瘙痒。血常规显示：Hb 53g/L ，WBC $7.8 \times 10^9/\text{L}$ ，Plt $75 \times 10^9/\text{L}$ 。为了防止再次发生过敏反应，应优先输入哪种血制品

- A. 辐照红细胞
- B. 去白细胞红细胞
- C. 冷冻解冻去甘油红细胞
- D. 灭活病原体红细胞
- E. 洗涤红细胞

方正医学网答案：E

14. 女，32 岁，心悸怕热多汗，停经 6 周。查体：双侧甲状腺弥漫性肿大，有突眼。实验室检查：TT₃、TT₄、FT₃、FT₄均升高，TSH 下降，TRAb 阳性，B 超提示宫内孕。下列治疗措施中正确的是

- A. 普萘洛尔
- B. 手术
- C. ¹³¹I 放疗
- D. 丙基硫氧嘧啶
- E. 碘剂

方正医学网答案：D

15. 男，68 岁，近 2 周来多饮、多尿、食欲减退，精神差，软弱无力。今晨发现神志不清而就诊。查体：血压 80/60mmHg，血糖 38.1mmol/L，尿糖(++++)，尿酮体(±)。最可能的诊断是

- A. 脑出血
 - B. 尿毒症
 - C. 糖尿病酮症酸中毒昏迷
 - D. 高渗性非酮症糖尿病昏迷
 - E. 乳酸中毒昏迷
- 方正医学网答案：D

16. 男，70 岁。双手指间关节疼痛 2 年，每日晨僵数分钟。查体：T36.6℃，P70 次/分，R18 次/分，BP100/70mmHg，皮肤未见皮疹，心肺腹未见异常，双手远端指间关节 Heberden 结节，双手近端指间关节骨性膨大。血沉正常，ASO(-)，RF(-)。可选择的一线治疗药物是

- A. 青霉素
- B. 秋水仙碱
- C. 柳氮磺吡啶

D. 双氯芬酸钠

E. 甲氨蝶呤

方正医学网答案：D

17. 女，40 岁，体检发现 HBsAg(-)，抗 HBs(+)，抗 HBc(+)，肝功能检查正常。最可能的情况是

- A. 急性 HBV 感染
 - B. 感染过 HBV，已产生免疫力
 - C. 感染过 HBV，已开始恢复
 - D. 接种过乙肝疫苗
 - E. 体内有病毒复制
- 方正医学网答案：B

18. 男，46 岁。农民，发热 6 天，于 9 月 16 日入院。体温持续在 39℃ 以上，伴寒战，全身乏力，明显头痛，近 2 日出现腹泻，每日 3-5 次，水样便。既往体健。查体：T39.5℃，P102 次/分，R22 次/分，BP135/78 mmHg。结膜充血，巩膜轻度黄染，咽红，腹股沟淋巴结轻度肿大，有压痛。心肺未见异常，腹软，压痛反跳痛(-)，肝肋下触及边缘，有触痛。腓肠肌压痛明

显。实验室检查：血 WBC $10.4 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.8。尿蛋白（+）。最可能诊断

- A. 病毒性肝炎急性黄疸型
- B. 败血症
- C. 钩端螺旋体病
- D. 肾综合征出血热
- E. 伤寒

方正医学网答案：C

19. 男，25 岁。尿道口不适 5 天，晨起尿道口可见薄层分泌物附着。发病 2 周前曾有不洁性性交。查体：尿道口轻度红肿，挤压龟头尿道口可见少许浆液性分泌物，涂片未见革兰阴性双球菌。最可能诊断是

- A. 生殖道衣原体感染
- B. 梅毒
- C. 淋病
- D. 生殖器疱疹
- E. 巨细胞病毒感染

方正医学网答案：A

20. 女，67 岁。车祸后即昏迷，伤后 2h 被送往医院。查体：昏迷状态，左顶枕部有一直径 4cm

头皮血肿，右侧瞳孔散大，对光反应消失，左侧肢体肌张力增高，病理反射阳性。头颅 CT 示右额颞部骨板下新月形高密度影。该患者最可能的诊断是

- A. 右额颞急性硬脑膜下积液，脑疝
- B. 右额颞急性硬脑膜外血肿，脑疝
- C. 右额颞颅内血肿，脑疝
- D. 右额颞脑挫伤，脑疝
- E. 右额颞急性硬脑膜下血肿，脑疝

方正医学网答案：E

21. 男，71 岁。进行性右手震颤、动作缓慢 3 年，翻身困难 1 年。查体：面具脸，右手静止性震颤，四肢肌张力增高，行走缓慢。有前列腺增生、轻度肾功能不全和房颤病史。对该患者最恰当的治疗药物是

- A. 安坦
- B. 复方左旋多巴
- C. 丙炔苯丙胺（司来吉兰）
- D. 金刚烷胺
- E. 溴隐亭

方正医学网答案：B

22. 男，36 岁。3 年内抽搐发作 20 余次，发作表现为无诱因的口角和右上肢抽搐，意识尚清，但不能对答，约 5~10s 后意识丧失伴全身抽搐。持续 30s 后，逐渐停止。事后不能回忆发作过程。发作间期的神经系统检查和常规脑电图检查未见异常。针对该患者的治疗首选药物是

A. 氯硝西泮 B. 苯妥英钠
C. 苯巴比妥 D. 乙琥胺
E. 卡马西平

方正医学网答案：E

23. 医生问患者为什么住院了，患者答道：“我有 2 个孩子，红桃代表我的心，你放开手，是计算机病毒，保养自己……”，这属于什么症状

A. 思维奔逸
B. 病理性赘述
C. 刻板言语
D. 持续言语
E. 思维破裂

方正医学网答案：E

24. 男，48 岁。近半年来记忆力渐差，刚讲过的话就忘记了。把别人做的事情说成是自己做的，且不认识家人，有时在深夜看到屋里有人影晃动。大量饮酒 10 年，最可能的诊断是

A. 酒精性妄想综合征
B. 酒精性幻觉症
C. 柯萨可夫综合征
D. Wernicke 脑病
E. 酒精性痴呆

方正医学网答案：C

25. 女，27 岁。3 个月前因工作失误受到领导批评，觉得脸上无光，整天闷闷不乐，脑子里反复考虑自己的错误，觉得同事看不起她，在背后议论她，不愿意出门，并出现失眠、早醒，近 1 周来出现兴奋多话，自我感觉好，说领导批评她是妒忌自己的才能，易激怒伴有冲动攻击行为。既往体健。改善目前较合理的治疗

A. 氯丙嗪治疗
B. 碳酸锂+喹硫平治疗

- C. 米氮平治疗
 D. 氯硝西洋治疗
 E. 丙戊酸钠治疗
 方正医学网答案：B

26. 女，40 岁。10 年前因胆结石行胆囊切除术，术后病情痊愈。2 年前单位倒闭，患者被安排到另一单位看大门，觉得看大门很没面子，但为生活着想又不得不去上班。1 年前患者出现胆囊区皮肤触摸疼痛、胀不适伴阵发性心悸、胸闷、失眠、心情不好。患者四处求医，反复做过腹部 B 超、胃镜、心电图、全套血液生化检查，结果均正常。服过一些药物，病情时好时坏。患者不相信任何检查结果及医师的解释，仍要继续医治。该患者的诊断是

A. 抑郁症
 B. 焦虑症
 C. 强迫症
 D. 胆囊切除术后综合征
 E. 躯体形式障碍
 方正医学网答案：E

27. 为了解某地区铅污染的情况，抽样收集了 130 人的尿铅值，经分析发现数据为偏态分布。若要对数据进行描述，应选择集中趋势和离散程度的指标为

A. 中位数和标准差
 B. 中位数和极差
 C. 中位数和四分位间距
 D. 算术均数和标准差
 E. 算术均数和四分位间距
 方正医学网答案：C

28. 欲用统计图比较 1994~2003 年城市和农村 3 岁以下儿童贫血患病率的变化趋势，选用何种统计图为合适

A. 条图 B. 线图
 C. 圆图 D. 直方图
 E. 散点图
 方正医学网答案：B

29. 在 1000 名病例与 1000 名对照的病例对照研究中。有 500 名病例和 200 名对照有暴露史，OR 值应为

A. 1.4 B. 2.3

C. 4.2 D. 无法计算

E. 4

方正医学网答案：E

30. 男，45 岁。因反复咳嗽一个月到社区卫生服务中心就诊。医生与其交谈得知该患者已经吸烟 20 多年。年前曾经尝试戒烟一个月并得到家人的支持和鼓励。家人对其的戒烟督促属于影响行为的

- A. 倾向因素 B. 促成因素
C. 强化因素 D. 内在因素
E. 诱导因素

方正医学网答案：C

31. 某人患有脚气病，可能是由于缺乏

- A. 维生素 A B. 核黄素
C. 叶酸 D. 维生素 D
E. 硫胺素（维生素 B）

方正医学网答案：E

32. 某聚会后有用餐者先后因腹痛、腹泻就诊。大部分患者出现上腹和脐周阵发性绞痛，继而腹泻，5~10 次/天，粪便

呈洗肉水样。调查发现聚餐的主要食物为海鲜（鱼虾）类食品。引起该食物中毒的病原菌最有可能是

- A. 葡萄球菌
B. 副溶血性弧菌
C. 沙门菌
D. 肉毒梭菌
E. 李斯特菌

方正医学网答案：B

33. 男，喜欢喝酒，家人为了给他戒酒，在酒里下了戒酒药，使酗酒者饮用后痛苦的恶心呕吐抵消了饮酒的欣快感，从而促使其戒酒，这种方法属于

- A. 系统脱敏 B. 冲击疗法
C. 厌恶疗法 D. 暗示疗法
E. 代币疗法

方正医学网答案：C

34. 医生告知某患者患有糖尿病并且让其接受药物治疗，但该患者并不相信自己患病，未听从医生的医嘱服药而是继续上班，该患者的角色行为类型属于

- A. 角色行为转化
- B. 角色行为缺如
- C. 角色行为强化
- D. 角色行为异常
- E. 角色行为冲突

方正医学网答案：B

35. 黄某 2001 年 10 月因医疗事故受到吊销医师执业证书的行政处罚，2002 年 9 月向当地卫生行政部门申请重新注册。卫生行政部门经过审查决定对黄某不予注册，理由是黄某的行政处罚自处罚决定之日起至申请注册之日止不满

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 4 年
- E. 5 年

方正医学网答案：B

36. 患者有损害，但医疗机构不承担赔偿责任

- A. 在抢救生命垂危患者等紧急情况下未尽到合理诊疗义务
- B. 患者或者其近亲属不配合诊疗
- C. 未经患者同意公开其病历资

料

- D. 未尽到与当时医疗水平相应的诊疗义务
 - E. 医务人员有明显医疗过错
- 方正医学网答案：B

37. 对临床诊疗道德中最优化原则理解全面的是

- A. 采取没有风险的治疗手段
- B. 选择以最小代价获得最大效果的治疗方案
- C. 选择让患者花费最少的治疗方案
- D. 尽可能使用保守治疗方案
- E. 采取使患者没有痛苦的治疗手段

方正医学网答案：B

38. 女，45 岁。1 年来久站或长时间行走时觉左下腹部胀痛不适。查体：T36.5℃，P80 次/分，R18 次/分，BP120/80mmHg。双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心律齐。腹软，无压痛，立位左腹股沟韧带下方内侧突起半球形肿物，平卧时可缩小，咳嗽时无明显冲击感，压迫内

环后肿物仍可复出。该患者最适宜的手术方法是

- A. Shouldice 法疝修补术
- B. McVay 法疝修补术
- C. Bassini 法疝修补术
- D. Halsted 法疝修补术
- E. Ferguson 法疝修补术

方正医学网答案：B

39. 男，55 岁。乙型肝炎病史 30 余年，3 小时前进食烧饼后突然出现呕血，量约 1000ml。查体：未发现全身皮肤、黏膜黄染和腹水，如果该患者需要接受急诊手术，最佳手术方式是

- A. 经颈静脉肝内分流术
- B. 非选择性门体分流术
- C. 选择性门体分流术
- D. 贲门周围血管断流术
- E. 脾切除术

方正医学网答案：D

40. 男，45 岁。突起寒战、发热、腹部胀痛 2 天。查体：T40℃，P100/分，BP130/80mmHg。皮肤未见淤点瘀斑，淋巴结无肿大。

双肺呼吸音粗糙，未闻及干湿性啰音，心率 100 次/分，律齐，心音有力。右上腹压痛伴肌紧张，无反跳痛。肝肋下 3cm。腹部 X 线片：右膈肌抬高，运动受限。腹部 B 超肝右叶占位性病变。最可能的诊断是

- A. 阿米巴肝脓肿
- B. 肝癌破裂
- C. 细菌性肝脓肿
- D. 急性胆管炎
- E. 急性肝炎

方正医学网答案：C

41. 男，44 岁。肝区疼痛 2 个月。呈持续性钝痛，放射至右肩背部，消瘦、乏力。查体：巩膜无黄染，肝肋下 3cm，质地稍硬，有结节感。AFP800 μg/L。B 超示肝右叶 8cm×6cm 占位病变，向外生长，周边血流量增强，门静脉正常。最理想的治疗方法是

- A. 肿瘤切除加放疗
- B. 姑息性肝切除术
- C. 根治性肝切除术
- D. 肝动脉化疗栓塞

E. 局部射频治疗

方正医学网答案：C

42. 男，50 岁，近 2 个月来大便次数增多，有肛门坠胀感及里急后重，大便变细。常有黏液血便，经抗生素治疗症状可缓解，但不久又复发，且呈进行性加重。若经病理检查证实为直肠癌，肿瘤下缘距肛门约 12cm，肿块直径约 4cm。最佳手术方式是

- A. Miles 手术
- B. 局部切除
- C. Hartmann 手术
- D. Dixon 手术
- E. 乙状结肠造口术

方正医学网答案：D

43. 男，60 岁，腹泻、便秘交替，粪便带血 6 个月，体重减轻 5kg。查体：T36.5℃，P80 次/分，R18 次/分，BP120/80mmHg，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心率 80 次/分，律齐，腹软，无压痛。血常规：Hb120g/L，WBC $15.6 \times 10^9/L$ ，N0.86。结肠

镜检查于乙状结肠见溃疡性病灶，超声内镜提示病灶侵犯肠壁浆膜下层，肠系膜可扪及 4 个区域淋巴结肿大。PET 显示全身其他部位未见癌转移。该病人 TNM 分期考虑为

- A. T₃N₂M₀
- B. T₂N₃M₀
- C. T₄N₃M₀
- D. T₃N₃M₀
- E. T₂N₂M₀

方正医学网答案：A

44. 男性，70 岁。3 小时前出现腹痛、呕吐、腹胀，长期便秘。钡剂灌肠见直肠、乙状结肠狭窄，横结肠扩张，肠黏膜呈“鱼肋骨刺”状改变，最可能的诊断是

- A. 十二指肠淤滞
- B. 小肠梗阻
- C. 乙状结肠扭转
- D. 横结肠扩张
- E. 粪石梗阻

方正医学网答案：C

45. 女性，52 岁，大便带血 3 个月，排便有下坠感，里急后重，直肠镜检查见距齿状线 8cm

处有一 3cm×3cm 肿块，菜花状，质脆，易出血，病理诊断为直肠癌。若选择手术，最佳术式为

- A. 经腹会阴直肠癌根治术
- B. 经腹直肠癌切除术
- C. 经腹直肠癌切除、人工肛门、远端封闭手术
- D. 拉下式直肠癌切除术
- E. 局部切除加放疗术

方正医学网答案：B

46. 男，45 岁。突发中上腹持续性疼痛，伴呕吐、尿黄 2 小时。发病前 3 小时大量饮酒，并进食较多油腻食物。查体：T37.5℃，P98 次/分，R22 次/分，BP130/80mmHg，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心率 98 次/分，心律齐，上腹有压痛及反跳痛。最有诊断价值的检查是

- A. 腹部 CT
- B. 胃镜
- C. 尿淀粉酶
- D. 腹部 X 线平片
- E. 血清淀粉酶

方正医学网答案：E

47. 患者男性，32 岁，反复间断性腹痛、腹泻 10 年，大便 3~4 次/日，多为不成形黄色便，不含黏液及脓血，排便后腹痛可缓解，查体：T36.8℃，体形消瘦，腹部平软，无压痛反跳痛。结肠镜检查未见明显异常。考虑治疗的药物首选

- A. 匹维溴铵
- B. 异烟肼
- C. 泼尼松龙
- D. 喹诺酮
- E. 柳氮磺胺吡啶

方正医学网答案：A

48. 女，28 岁。左上肢不慎被开水烫伤 1 小时。疼痛明显。查体：左前臂肘窝患者手掌大小皮肤红肿明显，有大小不一水疱，水疱无破裂，创面无明显异常感染，关于患者的治疗正确的是

- A. 抽去水疱液，消毒包扎
- B. 去除水疱皮，消毒包扎
- C. 注射破伤风类毒素
- D. 创面周围注射止痛药物

E. 消毒后局部加压包扎

方正医学网答案：A

（49~50 题共用题干）

男，40 岁。体重 60kg。右上肢肩关节以下，右下肢膝关节以下烧伤深度为浅 II° 至深 II°，右足部烧伤深度为 III°。

49. 该患者的烧伤总面积为

- A. 20% B. 38%
C. 37% D. 19%
E. 18%

方正医学网答案：D

50. 该患者第一个 24 小时的补液量应为

- A. 2500ml B. 1700ml
C. 2000ml D. 3700ml
E. 4000ml

方正医学网答案：D

51. 男，19 岁。在烈日下篮球 1 小时，大汗后出现头痛、头晕、胸闷、心悸、恶心，并有腹肌疼痛。T38.3℃，P108 次/分，BP90/60mmHg。神志清楚，面色潮红，双肺未闻及干湿性啰音，心律齐。最可能的诊断是

A. 热痉挛

B. 热衰竭

C. 低血糖

D. 热射病

E. 脱水

方正医学网答案：A

52. 女，40 岁，右乳腺癌 2.3cm × 4.5cm × 4.2cm，局部侵犯胸壁，不可推动，右侧腋窝扪及 5 枚质硬淋巴结，互相粘连融合，未发现远处转移，该患者临床分期是

- A. T₁N₂M₀ B. T₂N₂M₀
C. T₃N₂M₀ D. T₄N₁M₀
E. T₄N₂M₀

方正医学网答案：E

53.（助理不考）男，35 岁。被倒塌的房屋压伤左下肢 6 小时入院。查体：T37℃，P108 次/分，R28 次/分，左小腿大片肌肉撕脱，伤口处留有大量污物。急诊行清创处理，术后 3 天，患者体温逐步上升，烦躁不安，大量出汗，尿量明显减少。观察伤口：左下肢明显肿胀，见大量恶臭浆液血性渗出物。皮下可触及捻发音。下列处理措

施中，不正确的是

- A. 整块切除受累肌肉
- B. 术后勤换敷料
- C. 应用高压氧治疗
- D. 首选氨基糖苷类抗生素
- E. 病变区多处切开

方正医学网答案：D

54. 10 岁男孩。右侧阴囊肿大 2 年。晨起变小，活动后增大。

查体：右侧阴囊肿大，可触及囊性感，挤压时缩小，缩小后睾丸可触及正常大小。透光试验阳性。最可能的诊断是

- A. 腹股沟斜疝
- B. 睾丸鞘膜积液
- C. 精索鞘膜积液
- D. 交通性鞘膜积液
- E. 精索静脉曲张

方正医学网答案：D

55. 女，43 岁，既往肺结核病史经规范治疗后痊愈。4 天前出现发热伴咳嗽咳痰，当地医院怀疑肺结核复发，予以口服利福平治疗，3 天前出现全身肌肉及腰部酸痛，尿蛋白（++），红

细胞（++），白细胞（++），超声示双肾轻微肿大，实质性回声增强，最可能发生的是

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 慢性肾小球肾炎
- D. 急性间质性肾炎
- E. 泌尿系结核

方正医学网答案：D

56. 女性，62 岁，左腰痛伴发热 5 天，最高体温 39.2℃，抗生素治疗体温无明显下降，左肾区叩击痛，心率 102 次/分，血压 110/75mmHg。血常规：白细胞 $15.3 \times 10^9/L$ ，NO.85，尿沉渣：白细胞满视野，RBC3-5/HP。泌尿 CT 平扫：左肾扩张积水，左输尿管上段 1.2cm 结石，下一步治疗措施是

- A. 体外冲击波碎石
- B. 输尿管镜取石
- C. 尿道逆行置管术
- D. 膀胱输尿管镜取石
- E. 经皮肾镜取石

方正医学网答案：D

57. 男，68 岁。进行性排尿困难 5 年，夜尿 4~5 次。近期曾发生急性尿潴留 2 次，既往体健。心肺功能正常。前列腺 II 度肿大，血清 PSA $3.1 \mu\text{g/L}$ ，膀胱残余尿 80ml，首选的手术方法是

A. 双侧睾丸切除
B. 经会阴前列腺切除
C. 经尿道前列腺切除
D. 耻骨上前列腺切除
E. 耻骨后前列腺切除

方正医学网答案：C

58. 女，78 岁。跌倒右髌受伤 2 小时，局部疼痛，活动受限，患肢缩短，轴向叩击痛（+），X 线片显示右股骨颈基底部骨皮质连续性中断，断段嵌插，Pauwells 角 25° ，一般状态差，既往高血压，肺心病，糖尿病病史 30 余年，心功能 IV 级，最佳治疗方案是

A. 闭合复位内固定
B. 切开复位内固定
C. 下肢中立位皮牵引 6~8 周
D. 转子间截骨矫正力线
E. 人工关节置换术

方正医学网答案：C

59.（助理不考）男，24 岁。颜面部水肿、肉眼血尿伴咳嗽、痰中带血 1 周，少尿 3 天。BP160/100mmHg，尿蛋白（++），RBC20~30/HP，血 Cr $420 \mu\text{mol/L}$ ，血清抗肾小球基底膜抗体阳性。B 超示双肾增大。目前最关键的治疗是

A. 血液透析
B. 泼尼松
C. 血浆置换
D. 丙种球蛋白
E. 泼尼松联合环磷酰胺

方正医学网答案：C

60. 女，66 岁。2 小时前跌倒时手掌着地受伤。查体：右腕明显肿胀，压痛（+），侧面观呈“银叉样”畸形。最可能的诊断是

A. Galeazzi 骨折
B. Colles 骨折
C. Chance 骨折
D. Monteggia 骨折
E. Smith 骨折

方正医学网答案：B

61. 男孩，10 岁，摔倒时左侧手肘后部着地后出现左肘部疼痛、肿胀、活动受限。查体发现左肘部肿胀、畸形。X 线片示左侧肱骨远端骨折，远折端向前移位，骨折线从前上斜向后下方，未累积关节面。根据这些信息，最有可能的诊断是什么

- A. 肱骨外髁骨折
- B. 肱骨髁间骨折
- C. 伸直型肱骨髁上骨折
- D. 肱骨内髁骨折
- E. 屈曲型肱骨髁上骨折

方正医学网答案：E

62. 男性，19 岁，感冒 1 周后出现颜面及双下肢水肿。查体：血压 140/90mmHg，颜面及双下肢轻度浮肿。尿常规：蛋白（++），红细胞（+），Scr176 $\mu\text{mol/L}$ ，补体 C3 轻度下降。诊断为急性肾小球肾炎。下列哪类药物不宜使用

- A. 利尿剂
- B. 血管紧张素转换酶抑制剂

- C. 血管紧张素 II 受体拮抗剂
- D. 糖皮质激素
- E. 钙离子拮抗剂

方正医学网答案：D

63. 患者，女，29 岁，孕 36 周。产前检查见胎背位于母体腹部左侧，胎心位于左上腹，宫底可触及浮球感。诊断胎方位是

- A. LOA
- B. LOT
- C. RSA
- D. LSA
- E. LOP

方正医学网答案：D

64. 初产妇，24 岁，妊娠 39 周，BP130/75mmHg，枕右前位，估计胎儿体重 2800g，临产后 10 小时，宫缩逐渐减弱，胎膜已破，宫口开大 7cm，胎头+2，胎心 140 次/分，此时恰当的处理措施是

- A. 静脉滴注缩宫素
- B. 静脉注射麦角新碱
- C. 立即行剖宫产术
- D. 静脉注射地西泮
- E. 肌内注射缩宫素

方正医学网答案：A

65. 经产妇，35 岁。妊娠 40 周，规律宫缩 8 小时，近 2 小时产程无进展。静滴缩宫素后，产妇烦躁不安，腹痛加重，腹部拒按，出现病理缩复环。胎心 90 次/分，宫口扩张 2cm，S-1。最可能的诊断是

- A. 胎膜早破伴感染
- B. 子宫破裂
- C. 羊水栓塞
- D. 重度胎盘早剥
- E. 先兆子宫破裂

方正医学网答案：E

66. 女，34 岁，初产妇。妊娠 34⁺ 周，头痛 1 天。查体：BP165/110mmg，心率 150 次/分，胎儿大小相当于 32 周，羊水深度 2.0cm。尿蛋白（+++）。该患者正确的处理原则是

- A. 解痉降压后羊膜腔内药物引产
- B. 硫酸镁解痉后剖宫产
- C. 降压治疗后继续妊娠
- D. 对症处理继续妊娠
- E. 降压同时缩宫素引产

方正医学网答案：B

67. 女，24 岁。G₀P₀。右下腹隐痛半个月，加重 5 小时。月经不规律。查体：T37.0℃，P96 次 / 分，R22 次 / 分，BP105/75mmHg。妇科检查：子宫右旁可触及大小约 6cm 的实性包块，触痛，子宫及左侧附件未触及异常。血清 AFP900 μg/L。该患者最可能的诊断是

- A. 卵巢上皮性肿瘤
- B. 卵巢支持细胞-间质细胞瘤
- C. 卵巢颗粒细胞瘤
- D. 卵巢无性细胞瘤
- E. 卵巢卵黄囊瘤

方正医学网答案：E

68. 女，30 岁。人工流产术后闭经 7 个月，无腹痛。既往月经规律，尿妊娠试验阴性，基础体温双相型。最可能的诊断是

- A. Asherman 综合征
- B. Sheehan 综合征
- C. 闭经-溢乳综合征
- D. 空蝶鞍综合征
- E. 多囊卵巢综合征

方正医学网答案：A

（69~70 题共用题干）

女，39 岁，阴道口外可见脱出肿物 2 个月。妇科阴道可见宫颈及部分宫体，阴道前后壁均有轻度膨出。既往有高血压，糖尿病。药物控制血压、血糖较平稳。

69. 对该患者子宫脱垂程度判断正确的是

- A. I 度轻型 B. III 度
C. II 度轻型 D. I 度重型
E. II 度重型

方正医学网答案：E

70. 妇科检查宫颈长约 6 厘米，子宫后位正常大小，双附件区未触及肿物，该患者适合的治疗方案是

- A. 放置宫颈托
B. 宫骶韧带缩短术
C. 经阴道全子宫切除及阴道前后壁修补
D. 阴道全封闭术
E. 阴道前后壁修补术+主韧带缩短+宫颈部分切除

方正医学网答案：E

71. 一健康儿童体检结果为：身高 105cm。体重 16kg，尚未开始换牙，腕部骨化中心数为 5 个，按照小儿生长发育的一般规律，其最可能的年龄是

- A. 6 岁 B. 8 岁
C. 4 岁 D. 5 岁
E. 7 岁

方正医学网答案：C

72. 女婴，14 天。拒奶、少尿、体温不升 8 小时急诊入院。检体：重病容，面色苍白，前囟平软，心音低钝，双肺未闻及啰音，腹胀，肝右肋 3cm，脐有少许分泌物。实验室检查：血 WBC $5.0 \times 10^9/L$ ，N0.70，L0.30。最可能的诊断是

- A. 新生儿寒冷损伤综合征
B. 新生儿化脓性脑膜炎
C. 新生儿肺炎
D. 新生儿颅内出血
E. 新生儿败血症

方正医学网答案：E

73. 5 岁男孩，高热 7 天，皮肤

黏膜损害 3 天入院。查体：热病容，反应良好。结膜充血，口腔黏膜发红、干裂。右颈部淋巴结肿大，大小约 $1\text{cm} \times 1\text{cm}$ 。全身红色斑丘疹，手足微肿胀。心肺无异常，肝脾无肿大。末梢血 $\text{WBC} 15 \times 10^9/\text{L}$ 。血细菌培养阴性。该患者的治疗首选

- A. 阿司匹林+丙种球蛋白
- B. 糖皮质激素
- C. 阿司匹林+糖皮质激素
- D. 糖皮质激素+丙种球蛋白
- E. 双嘧达莫+丙种球蛋白

方正医学网答案：A

74. 10 个月婴儿发热，体温高达 39°C ，咽红，精神状态尚好，静滴 3 日头孢唑啉及双黄连，第 4 天热退，但患儿皮肤出现红色斑丘疹，颈部及躯干明显，既往曾用过头孢唑啉，诊断最可能为

- A. 麻疹
- B. 药疹
- C. 风疹
- D. 幼儿急疹
- E. 荨麻疹

方正医学网答案：D

75. 女孩，1 岁。因呕吐、频繁水样便 3 天伴发热于 10 月底入院。12 小时无尿。查体： $\text{T} 38^\circ\text{C}$ ，颜面苍白，皮肤弹性差，眼窝凹陷，心肺听诊无异常，腹稍胀，肝脾无肿大，膝腱反射未引出，四肢末端厥冷。实验室检查：血钠 $145\text{mmol}/\text{L}$ 。最可能的诊断是

- A. 侵袭性大肠埃希菌肠炎
- B. 轮状病毒肠炎
- C. 致病性大肠埃希菌肠炎
- D. 真菌性肠炎
- E. 产毒性大肠埃希菌肠炎

方正医学网答案：B

76. 患儿，女，3 岁。活动后气急、口唇青紫 1 年余。查体，胸骨左缘第 2~4 肋间闻及 3/6 级喷射性收缩期杂音。胸部 X 线片示心影稍增大，心尖圆钝上翘，肺动脉段凹陷，肺门血管影缩小，肺血少，肺透亮度增加。最可能的诊断是

- A. 肺动脉瓣狭窄
- B. 房间隔缺损
- C. 室间隔缺损

D. 动脉导管未闭

E. 法洛三联症

方正医学网答案：E

77. 男孩，3 岁。因颜面及四肢凹陷性水肿 1 周来诊。查体：

BP85/55mmHg，尿蛋白（+++），

RBC1-2/HP，血浆总蛋白 40g/L，

白蛋白 24g/L，胆固醇

6.2mmol/L，尿素氮 5.5mmol/L，

最可能的诊断是

A. 单纯型肾病综合征

B. 急进型肾小球肾炎

C. IgA 肾病

D. 肾炎型肾病综合征

E. 急性肾小球肾炎

方正医学网答案：A

78. 女，10 个月。生后母乳喂养

（其母以素食为主）。面色苍黄、

不喜动 2 个月。查体：精神呆滞，

面色黄，头发稀疏黄软，浅表淋

巴结（-）。心尖部 2/6 级收缩

期杂音，肺（-），肝肋下 0.5cm，

脾未触及。外周血 Hb58g/L，

RBC $2.5 \times 10^{12}/L$ ，MCV96fl。该患

儿最可能的诊断是

A. 巨幼细胞性贫血

B. 再生障碍性贫血

C. 失血性贫血

D. 缺铁性贫血

E. 溶血性贫血

方正医学网答案：A

79. 心动周期中，在下列哪个时期左心室内压力最高

A. 心房收缩期末

B. 等容收缩期末

C. 心室收缩期末

D. 快速充盈期末

E. 快速射血期末

方正医学网答案：E

80. 慢性菌痢患者长期服用广谱抗生素，将会导致哪种维生素的缺乏

A. 维生素 A 和维生素 B 复合物

B. 维生素 D 和维生素 E

C. 维生素 E 和维生素 A

D. 维生素 K 和维生素 B 复合物

E. 叶酸和维生素 K

方正医学网答案：D

81. 男，59 岁，因急性心肌梗死

急诊入院，发作前患者曾与家属发生激烈争吵，在此案例中，引起急性心肌梗死发作主要的生理机制是

- A. 肾素-血管紧张素-醛固酮系统过度兴奋
 - B. 交感-肾上腺髓质系统过度兴奋
 - C. 下丘脑-垂体-性腺轴过度兴奋
 - D. 下丘脑-垂体-甲状腺轴过度兴奋
 - E. 内源性阿片系统过度兴奋
- 方正医学网答案：B

82. 慢性支气管炎患者发生阻碍性通气功能障碍的病变基础是

- A. 支气管上皮细胞变性、坏死
- B. 支气管平滑肌萎缩
- C. 支气管软骨萎缩、纤维化
- D. 支气管腺体增生、肥大
- E. 细支气管炎及细支气管周围炎

方正医学网答案：E

83. 下列哪项不是胃溃疡的病理特点

- A. 周边黏膜充血水肿
 - B. 表面可有炎性渗出物
 - C. 可见坏死组织
 - D. 可见肉芽组织
 - E. 底部可见异型细胞
- 方正医学网答案：E

84. 男，30岁，寒战、高热，咳铁锈色痰3天，加重1天，查体：右下肺可闻及湿啰音，痰培养：肺炎链球菌（+），影像学提示右肺下野大片致密阴影。右肺病灶处肺泡腔内的主要成分是

- A. 浆液和红细胞
 - B. 中性粒细胞和纤维素
 - C. 纤维素和红细胞
 - D. 浆液和巨噬细胞
 - E. 淋巴细胞和纤维素
- 方正医学网答案：C

85. 女，30岁。呕吐，腹胀5天。神志不清，胡言乱语1天，平素体健。查体：T36.5℃，P90次/分，R18次/分，BP120/80mmHg，巩膜明显黄染，心肺未见明显异常。腹软，无压痛，

肝浊音界缩小。实验室检查：
血 ALT520U/L, Tbil215 $\mu\text{mol/L}$,
Dbil138 $\mu\text{mol/L}$ 。典型的肝脏
病理改变主要的是

- A. 汇管区纤维化
- B. 多个小叶或大块肝细胞坏死
- C. 淤血性改变
- D. 汇管区中性粒细胞浸润
- E. 肝细胞脂肪变性

方正医学网答案：B

86. 男，42 岁。间断水肿 2 年，
乏力 2 个月。查体：BP155/100
mmHg，心肺腹未见异常，下肢
凹陷性水肿，实验室检查：尿
RBC 20~25/HP，为异形红细胞，
尿蛋白定量 1.9g/d，血 Hb98g/L，
Scr202 $\mu\text{mol/L}$ ，B 超示双肾稍
萎缩。最可能的诊断是

- A. 肾病综合征
- B. IgA 肾病
- C. 高血压肾损害
- D. 慢性间质性肾炎
- E. 慢性肾小球肾炎

方正医学网答案：E

87. 合并冠状动脉痉挛性心绞

痛的高血压患者宜首选

- A. β 受体阻滞剂
- B. 利尿剂
- C. 血管紧张素转换酶抑制剂
(ACEI)
- D. 钙通道阻滞剂
- E. α 受体阻滞剂

方正医学网答案：D

88. 男，68 岁。反复咳嗽，咳痰
20 余年，气短 5 年。患者长期
使用吸入糖皮质激素及支气管
舒张剂治疗，近一周症状控制
欠满意，联合使用某药物治疗，
此后出现排尿困难。该患者近
来增加的药最可能是

- A. 茶碱类
- B. M 受体拮抗剂
- C. β_2 受体激动剂
- D. 口服糖皮质激素
- E. 祛痰药

方正医学网答案：C

89. 女，65 岁。反复咳嗽、咳痰
20 年，活动后气促 5 年，反复
双下肢水肿 6 个月。1 周前受凉
后咳嗽、咳痰增多，气促加重，

烦躁失眠。动脉血气分析：pH 7.29, PaCO₂80mmHg, PaO₂55 mmHg, BE+2.1mmol/L。应考虑酸碱失衡状态为

- A. 代偿性呼吸性酸中毒
- B. 代偿性呼吸性碱中毒
- C. 失代偿性呼吸性碱中毒
- D. 失代偿性呼吸性酸中毒
- E. 失代偿性代谢性酸中毒

方正医学网答案：D

90. 男，47 岁，3 小时内呕吐咖啡色液体约 800ml，伴头晕，心悸。发病期间无自主排尿。查体显示体温正常，心率、呼吸加快，血压明显降低。面色苍白，皮肤湿冷。尿比重升高。导致患者症状的可能原因是

- A. 肾血流量减少
- B. 肾小球滤过面积减少
- C. 肾小管原尿返漏
- D. 肾小球滤过膜通透性降低
- E. 肾小管管型阻塞

方正医学网答案：A

91. 女婴，8 个月，发热，烦躁 1 天，T38.7℃，P105 次/分，

R35 次/分，BP80/62mmHg，神差，呼吸急促，左肺底可闻及湿啰音，心音低钝，腹膨隆，四肢皮温低，可见大理石纹。WBC19 × 10⁹/L，N0.8，X 线左下肺片状影，问休克类型是

- A. 心源性休克
- B. 感染性休克
- C. 神经源性休克
- D. 低血容量性休克
- E. 过敏性休克

方正医学网答案：B

92. 男，57 岁。反复咳嗽，咳痰 10 余年，加重伴喘憋 3 余年。吸烟 10 年，20 支/d。查体：桶状胸，双肺呼吸音低，叩诊过清音，未闻及干湿啰音。动脉血气分析：pH7.39, PaO₂65mmHg, PaCO₂43mmHg, 肺功能检查：FEV₁ 占预计值 52%，FEV₁/FVC51%，造成该患者通气功能障碍的主要病理生理机制是

- A. 肺内功能性分流减少
- B. 肺弥散面积增大
- C. 肺脏非弹性阻力减少
- D. 肺脏无效腔减少

E. 弥散功能障碍

方正医学网答案：E

93. 下列哪种氨基酸是生酮氨基酸

- A. 谷氨酸
- B. 丙氨酸
- C. 亮氨酸
- D. 甘氨酸
- E. 蛋氨酸

方正医学网答案：C

94. 下列关于 DNA 双螺旋结构的叙述，正确的是

- A. 一条链是左手螺旋，另一条链是右手螺旋
- B. 双螺旋结构的稳定纵向靠氢键维系
- C. A+T 与 G+C 的比值为 1
- D. 两条链的碱基间以共价键相连
- E. 磷酸、脱氧核糖构成螺旋的骨架

方正医学网答案：E

95. 木的“所不胜”之“子”

- A. 木
- B. 水
- C. 金
- D. 火
- E. 土

方正医学网答案：B

96. 下列各项，属依据五行相克规律确定的治法是

- A. 滋水涵木法
- B. 泻南补北法
- C. 益火补土法
- D. 培土生金法
- E. 金水相生法

方正医学网答案：B

97. 呕吐，吐势徐缓，声音微弱，呕吐物清稀，其临床意义是

- A. 寒饮停胃，胃失和降
- B. 痰湿中阻，胃失和降
- C. 胃阴不足，胃气上逆
- D. 脾胃阳虚，胃失和降
- E. 饮邪停胃，胃气上逆

方正医学网答案：D

98. 患者身热不扬，午后热甚，头身困重，舌红苔黄腻，脉濡数。此证之发热属于

- A. 阴虚潮热
- B. 阳明潮热
- C. 湿温潮热
- D. 气虚发热
- E. 阳明经热

方正医学网答案：C

99. 女，30 岁，经产妇。自然分娩后 1 天，下腹阵发性疼痛。查体：T37.6℃，宫底平脐，质硬，无压痛，阴道有暗红色流血，少于月经量。首先考虑的诊断是

- A. 正常产褥
- B. 产后出血
- C. 子宫复旧不良
- D. 产褥中暑
- E. 产褥感染

方正医学网答案：A

100. 男孩，1 岁。未接种过卡介苗，其父患活动性肺结核，时有咯血。目前小儿与父母生活在一起，但无任何症状。小儿胸部 X 线片未见异常，PPD 试验（+）。除隔离父亲外，宜对小儿采取的措施是

- A. 口服异烟肼，疗程 1 年
- B. 继续观察，暂不作任何处理
- C. 口服利福平，疗程 1 年
- D. 口服利福平+异烟肼，疗程 3 个月
- E. 立即接种卡介苗

方正医学网答案：D