



乡村全科执业助理医师笔试

考前 (乡医) 100 题



多看一题



多考一分

主编 方正医考教研室



方正教育
FZ EDUCATION



扫码获取分校联系方式



关注“方正网校”获取更多资讯

全国加盟：胡老师 17837886667

乡村全科执业助理医师资格考试

考前 100 题

1. 男性，29 岁，大量饮酒后呕吐鲜血一小时，量约 800ml，查体 P110 次/分，血压 92/65 mmHg，神志清楚，未见肝掌，蜘蛛痣，腹软，无压痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音 12 次/分，为明确诊断最有意义的检查

- A. 腹部 CT
- B. 上消化道 X 线钡餐造影
- C. 腹部 X 线平片
- D. 腹部 B 超
- E. 胃镜

方正医学网答案：E

2. 女，35 岁。寒战、发热、腰痛伴尿频、尿急 3 天。体温 39℃，心肺无异常。肝脾肋下未触及。两侧肋脊角有叩击痛。尿液检查：蛋白（-），镜检红细胞 2~5 个/HP、白细胞 10~15 个/HP，诊断应首先考虑

- A. 急性膀胱炎
- B. 急性肾盂肾炎

- C. 急性肾小球肾炎
- D. 肾结核
- E. 肾结石

方正医学网答案：B

3. 男性，23 岁，上腹痛 2 年，常空腹及夜间发生，进食后可缓解。半小时前餐后突感上腹部持续性剧痛。查体：腹式呼吸消失，上腹肌紧张，有压痛反跳痛，肝浊音界消失，肠鸣音消失。考虑最可能的诊断是

- A. 急性肠梗阻
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性胰腺炎
- D. 十二指肠溃疡穿孔
- E. 胃溃疡穿孔

方正医学网答案：D

4. 肝硬化失代偿期，属于肝功能减退表现的是

- A. 脾肿大
- B. 肝掌、蜘蛛痣

C. 腹壁静脉曲张

D. 腹水

E. 食管胃底静脉曲张

方正医学网答案: B

5. 女, 27 岁。妊娠 4 个月, 因转移性右下腹痛 2 小时就诊。经检查诊断为急性阑尾炎, 其治疗措施错误的是

A. 行阑尾切除术

B. 围手术期加用黄体酮

C. 手术切口应偏低

D. 尽量不用腹腔引流

E. 可应用广谱抗生素

方正医学网答案: C

6. 男, 28 岁, 右大腿清创缝合术后 6 天后发热, 局部伤口红肿, 范围较大, 疼痛明显。伤口局部见稀薄脓液, 淡红色, 量多, 无腥味。最可能感染的致病菌是

A. 大肠埃希菌

B. 铜绿假单胞菌

C. 溶血性链球菌

D. 金黄色葡萄球菌

E. 无芽孢厌氧菌

方正医学网答案: C

7. 男, 18 岁。右足和右小腿被开水烫伤, 有水疱伴剧痛。创面基底肿胀发红。该患者烧伤面积和深度的诊断为

A. 5%浅 II 度

B. 5%深 II 度

C. 10%浅 II 度

D. 10%深 II 度

E. 30%浅 II 度

方正医学网答案: C

8. 某男, 45 岁, 因右上肢放射痛伴手指麻木, 动作不灵活 2 年就诊, 检查发现颈肩部压痛。神经牵拉试验及压头试验阳性, 右上肢桡侧皮肤感觉减退, 握力减弱, 肌张力减低, 最可能的诊断是

A. 交感神经型颈椎病

B. 脊髓型颈椎病

C. 椎动脉型颈椎病

D. 神经根型颈椎病

E. 混合型颈椎病

方正医学网答案: D

9. 患者男, 65 岁。发现右腹股沟内侧包块 3 年余。3 天前腹股沟包块突然增大, 变硬, 不能还纳, 伴剧烈疼痛。8 小时前疼痛有所缓解, 但出现发热。患者最有可能出现了

- A. 易复性疝
- B. 难复性疝
- C. 嵌顿性疝
- D. 绞窄性疝
- E. 急性阑尾炎

方正医学网答案: D

10. 女, 39 岁。因半小时前误服农药乐果急诊就诊。不正确的处理措施是

- A. 对症治疗
- B. 心肌保护治疗
- C. 保持呼吸道通畅
- D. 高锰酸钾溶液洗胃
- E. 反复推注阿托品至阿托品化

方正医学网答案: D

11. 男, 8 岁。足部刺伤 1 小时, 已接受计划性混合疫苗注射, 为预防破伤风, 最重要的正确处置是

- A. 刺伤部切开不予缝合
- B. 注射 TAT750U
- C. 注射 TAT1500U
- D. 注射 TAT3000U
- E. 注射破伤风类毒素 0.5ml

方正医学网答案: E

12. 男, 12 岁。不慎摔倒后意识丧失, 约 5 分钟后清醒, 轻微头痛, 不能回忆受伤时情形, 无恶心、呕吐, 无视物模糊等症状, 查体: 神经系统检查无阳性体征。最可能的诊断是

- A. 脑震荡
- B. 颅内血肿
- C. 脑挫裂伤
- D. 硬膜外血肿
- E. 短暂性脑缺血发作

方正医学网答案: A

13. 男, 30 岁。驾车撞树受伤。伤后右髋关节疼痛剧烈、不能活动。查体: 患肢短缩, 呈屈曲、内收、内旋畸形。应首先考虑的诊断是

- A. 股骨颈骨折
- B. 股骨干骨折

C. 髋关节后脱位

D. 髋关节前脱位

E. 坐骨神经损伤

方正医学网答案：C

14. 女，20 岁，左乳房红肿、增大 1 个月，进展较快，无疼痛、发热。查体：左乳房红肿，局部温度略高，发硬，但未触及包块，左腋窝有肿大淋巴结，稍硬，活动度好，无压痛。血常规正常。最可能的诊断是

A. 急性乳腺炎

B. 乳腺增生症

C. 导管内乳头状瘤

D. 乳房结核

E. 炎性乳腺癌

方正医学网答案：E

15. 肝硬化患者出现蜘蛛痣和男性乳房发育的主要机制是

A. 肝脏合成激素能力减低

B. 肝脏对从肠道吸收的有毒物质解毒能力减低

C. 肝脏对血管活性物质和雌激素的灭活功能降低

D. 门脉高压症

E. 肾素-血管紧张素-醛固酮系统紊乱

方正医学网答案：C

16. 男，55 岁。出车祸后 6 小时。6 小时来未排尿，置导尿管导出黄色尿液 50ml。查体：T 36.5℃，P 140 次/分，R 28 次/分，BP 65/50mmHg，意识模糊，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心律齐，腹部膨隆，四肢冰冷。最可能的诊断为

A. 轻度休克，神经源性休克

B. 重度休克，神经源性休克

C. 重度休克，低血容量性休克

D. 中度休克，低血容量性休克

E. 中度休克，神经源性休克

方正医学网答案：C

17. 男性，33 岁。右胸车祸伤 1 小时。呼吸困难，发绀。查体：脉搏 130 次/分，血压 76/50 mmHg，右前胸可触及皮下气肿，右胸叩诊鼓音，右肺呼吸音消失。最可能的诊断是

A. 张力性气胸

B. 闭合性气胸

C. 创伤性血胸

D. 创伤性休克

E. 肋骨骨折

方正医学网答案：A

18. 男性，20 岁。右胸撞伤后疼痛，无明显喘憋，呼吸 20 次/分，脉搏 85 次/分，胸廓挤压征阳性，胸片右肺压缩 5%。适当的处理

A. 胸膜腔穿刺抽气

B. 胸腔闭式引流

C. 镇痛观察

D. 输液

E. 吸氧

方正医学网答案：C

19. 典型慢性肾功能不全的水电解质紊乱是

A. 高血钾、低血钙、低血磷、高血镁、代谢性酸中毒

B. 高血钾、低血钙、高血磷、高血镁、代谢性酸中毒

C. 高血钾、高血钙、低血磷、低血镁、代谢性酸中毒

D. 高血钾、低血钙、高血磷、低血镁、代谢性酸中毒

E. 高血钾、高血钙、低血磷、高血镁、代谢性酸中毒

方正医学网答案：B

20. 反科雷（Colles）骨折、Smith 骨折的典型移位是

A. 远侧端向掌侧移位

B. 远侧端向尺侧移位

C. 远侧端向旋转移位

D. 近侧端向掌侧移位

E. 近侧端向旋转移位

方正医学网答案：A

21. 急性化脓性中耳炎早期最有效的治疗是

A. 抗生素加激素全身应用

B. 抗生素全身应用

C. 抗生素溶液滴耳

D. 2%酚甘油滴耳

E. 咽鼓管吹张

方正医学网答案：B

22. 急性有机磷中毒患者应用阿托品过量引起中毒时，解毒剂是

A. 依地强钠钙

B. 毛果芸香碱

C. 青霉胺

D. 亚甲蓝

E. 二巯基丙醇

方正医学网答案: B

23. 关于电击伤的介绍, 哪项不正确

A. 出现痛性肌肉收缩, 惊恐, 面色苍白

B. 出现头痛, 头晕, 心悸

C. 出现心律失常, 心脏骤停

D. 出现呼吸极微弱呈“假死状态”, 呼吸停止

E. 电击伤部位有出血表现

方正医学网答案: E

24. 男, 68 岁, 饮酒后不能自行排尿 5 小时急诊住院, 体检见耻骨上有包块, 有轻压痛。该患者最可能的病因是

A. 前列腺增生

B. 尿道狭窄

C. 膀胱肿瘤

D. 尿道结石

E. 神经性膀胱炎

方正医学网答案: A

25. 男, 26 岁, 右侧阴囊增大不适半年。检查肿块约 $2.0\text{cm} \times 2.5\text{cm}$ 大小, 有囊性感, 无压痛, 平卧位不消失, 透光试验阳性。双侧睾丸附睾可清楚触及, 大小位置正常。应诊断为

A. 睾丸鞘膜积液

B. 睾丸肿瘤

C. 腹股沟疝

D. 精索鞘膜积液

E. 阴囊橡皮肿

方正医学网答案: D

26. 女性, 25 岁, 误服敌敌畏 10ml 半小时后昏迷来院, 诊断急性有机磷中毒。下列属于烟碱样症状的是

A. 瞳孔缩小

B. 肌纤维束颤动

C. 多汗

D. 流涎

E. 肺水肿

方正医学网答案: B

27. 男性, 23 岁。车祸 30min 后, 因出现极度呼吸困难送来急诊。查体右胸部饱满, 呼吸

音消失，叩诊呈鼓音。右胸部有骨擦音、皮下气肿。首要的急救措施是

- A. 输血、输液
- B. 镇静、吸氧
- C. 胸部固定
- D. 剖胸探查
- E. 胸腔穿刺排气

方正医学网答案：E

28. 男，72 岁反复排尿困难，尿流中断 1 年，改变体位后能继续排尿，既往前列腺增生 10 年，口服药物治疗。最可能导致尿流中断的原因是

- A. 膀胱结石
- B. 前列腺增生
- C. 前列腺癌
- D. 输尿管结石
- E. 尿道结石

方正医学网答案：A

29. 男，56 岁，上腹不适 6 年，上腹痛伴早饱。嗝气 2 个月，口服法莫替丁后疼痛减轻。胃镜及胃黏膜活组织病理检查提示胃窦中度慢性萎缩性胃炎伴

轻度异型增生，¹³C 尿素呼气试验阳性，最适宜的处理措施是

- A. 口服奥美拉唑，定期复查胃镜
- B. 胃大部切除术，术后根除幽门螺杆菌
- C. 根除幽门螺杆菌，定期复查胃镜
- D. 口服黏膜保护剂及消化酶，定期复查胃镜
- E. 口服多潘立酮及消化酶，定期复查胃镜

方正医学网答案：C

30. 成人排便时肛门滴血，有痔核脱出，便后自行回纳。属于

- A. 一期内痔
- B. 二期内痔
- C. 三期内痔
- D. 嵌顿性内痔
- E. 血栓性外痔

方正医学网答案：B

31. 女，45 岁。反复发作左耳黏性液体流出 2 年，5 天前沐浴后左耳持续有黏性液体流出，无耳痛。查体：无耳廓牵拉痛，左外耳道见较多黏脓性分泌物，清除分泌物后见外耳道皮

肤无红肿，左鼓膜紧张部见中央性穿孔，鼓室内亦见分泌物聚积。最可能的诊断是

- A. 耳疖
- B. 急性外耳道炎
- C. 分泌性中耳炎
- D. 急性化脓性中耳炎
- E. 慢性化脓性中耳炎

方正医学网答案：E

32. 全科医疗中以问题为导向医疗记录的 SOAP 式问题中 P 指的是

- A. 健康问题的处理计划
- B. 对健康问题的评估
- C. 药物治疗方案
- D. 客观资料
- E. 主观资料

方正医学网答案：A

33. 男，45 岁。误食富含亚硝酸盐的食物后出现全身皮肤黏膜发绀伴胸闷、头晕、恶心半天。既往体健。该患者发绀最可能的原因是

- A. 支气管哮喘
- B. 高铁血红蛋白血症

C. 体循环淤血

D. 急性肺栓塞

E. 急性呼吸衰竭

方正医学网答案：B

34. 男，70 岁，便血 3 天，为鲜红色血压附着于粪便表面，伴大便形状变细，不伴肛门疼痛。

首选检查是

- A. 胃镜
- B. 直肠指检
- C. 腹部 CT
- D. 腹部 B 超
- E. 立位腹部 X 线片

方正医学网答案：B

35. 女，76 岁。1 小时前被家属发现意识不清急送入院。患者有慢性阻塞性肺疾病史 20 年，近 2 天来烦躁。查体：P108 次/分，BP150/90mmHg，昏迷，球结膜水肿，口唇发绀，双下肺可闻及湿啰音，双侧 Babinski（±）。最可能的诊断是

- A. 肺性脑病
- B. 中毒
- C. 电解质紊乱

D. 急性左心衰竭

E. 脑血管病

方正医学网答案: A

36. 男, 27 岁。4 天前受凉后出现寒战、高热, 继之咳铁锈色痰伴右侧胸痛。查体: $T39.5^{\circ}\text{C}$, $P112$ 次/分, $R24$ 次/分。急性病容, 口角有疱疹。血 $WBC12 \times 10^9/L$ 。胸部 X 线片显示右下肺斑片状阴影。最可能的诊断为

A. 干酪性肺炎

B. 葡萄球菌肺炎

C. 肺炎链球菌肺炎

D. 肺炎支原体肺炎

E. 急性肺脓肿

方正医学网答案: C

37. 洋地黄中毒时心电图变化中, 最常见的为

A. 心房颤动

B. QT 间期缩短

C. 房性期前收缩

D. 房室传导阻滞

E. 室性期前收缩

方正医学网答案: E

38. 男, 68 岁。陈旧性前壁心肌梗死 5 年, 劳累后心悸、气短 3 年, 双下肢水肿半年。近 1 周气短加重, 体力活动明显受限, 从事一般家务活动即感喘憋, 入院时心电图与 2 个月前相比无变化。该患者的心功能分级为

A. NYHA 分级 II 级

B. NYHA 分级 III 级

C. Killip 分级 II 级

D. Killip 分级 III 级

E. Killip 分级 IV 级

方正医学网答案: B

39. 女, 67 岁。高血压病史 8 年, 最高血压达 $160/100\text{mmHg}$ 。实验室检查: 血肌酐 $82\mu\text{mol/L}$ 。其父亲因高血压去世。该患者正确的诊断是

A. 高血压 2 级, 很高危

B. 高血压 2 级, 高危

C. 高血压 2 级, 中危

D. 高血压 3 级, 高危

E. 高血压 3 级, 很高危

方正医学网答案: C

40. 铁剂治疗缺铁性贫血最早出现的指标是

- A. 血清铁蛋白升高
- B. 血红蛋白升高
- C. 红细胞升高
- D. 网织红细胞升高
- E. 骨髓细胞外铁升高

方正医学网答案: D

41. 女, 6 岁, 玩耍时玩具掉地意识丧失, 1 分钟后恢复正常, 2 月来反复发作。诊断为

- A. 局限性发作
- B. 阵挛性发作
- C. 强直-阵挛性发作
- D. 失神发作
- E. 失张力发作

方正医学网答案: D

42. 男, 23 岁, 3 个月前起病, 说话语无伦次, 常自言自语, 说自己是神仙, 是伟人, 对异性有非分之想, 攻击亲人。查意识清晰, 兴奋躁动, 思维破碎, 内容离奇, 难以理解, 认为门外有人要杀他, 有一台电

脑在影响他的大脑, 使大脑在不停地转。躯体及神经系统检查未见显著体征。诊断是

- A. 躁狂症
- B. 抑郁症
- C. 精神分裂症
- D. 心因性精神障碍
- E. 神经症

方正医学网答案: C

43. 女, 33 岁。2 小时前运动过程中出现剧烈头痛、呕吐。查体: 神清, 颈部抵抗, 克尼格征 (+), 双侧病理征阴性。最可能的诊断是

- A. 脑出血
- B. 神经痛
- C. 丛集性头痛
- D. 紧张型头痛
- E. 蛛网膜下腔出血

方正医学网答案: E

44. 诊断甲亢 (Graves 病) 最有价值的体征是

- A. 皮肤湿润多汗、手颤
- B. 阵发性心房纤颤
- C. 甲状腺肿大伴震颤和血管杂

音

D. 收缩压升高，舒张压降低，
脉压增大

E. 窦性心动过速

方正医学网答案：C

45. 女，55 岁，体重 76kg，身高 160cm。因多饮、多尿确诊为 2 型糖尿病，经饮食治疗和运动锻炼，2 个月后空腹血糖为 8.8mmol/L，餐后 2 小时血糖为 13mmol/L。进一步治疗应选择

A. 加双胍类降血糖药物

B. 加胰岛素治疗

C. 维持原饮食治疗和运动

D. 加磺脲类降血糖药物

E. 加口服降血糖药和胰岛素

方正医学网答案：A

46. 男童，3 岁，发热伴流涕流泪，声音嘶哑，咳嗽 4 天。1 天前自耳后出现淡红色斑丘疹，自上而下，由躯干向四肢扩展。查体：结膜充血，口腔颊黏膜有针尖大小的灰白色小点，周围红晕。最可能的诊断是

A. 麻疹

B. 风疹

C. 猩红热

D. 荨麻疹

E. 幼儿急疹

方正医学网答案：A

47. 男婴，6 个月，人工喂养，近 2 个月夜惊、易醒、多汗、烦躁，未出牙。查体：前囟增大，枕秃（+）。心肺腹及神经系统查体无异常。最可能的诊断是

A. 佝偻病初期

B. 佝偻病活动期

C. 佝偻病恢复期

D. 佝偻病后遗症期

E. 软骨营养不良

方正医学网答案：A

（48～49 题共用题干）

男婴，8 月龄。呕吐、腹泻 2 天，大便 12～14 次/日，水样便，尿量明显减少。查体：哭时泪少，眼窝及前囟凹陷。皮肤明显干燥，弹性差，四肢末梢稍凉。

48. 该患儿腹泻后的表现符合

A. 无脱水

B. 轻度脱水

C. 中度脱水 D. 重度脱水

E. 极重度脱水

方正医学网答案: C

49. 根据患儿脱水程度, 24 小时内补液总量应为

A. 60~90ml/kg

B. 90~120ml/kg

C. 120~150ml/kg

D. 150~180ml/kg

E. 180~210ml/kg

方正医学网答案: C

50. 慢性乙肝患者, 化验乙肝五项指标: HBsAg (+), 抗 HBc (+), HBeAg (+), ALT120U/L, 其意义是

A. 病毒有复制, 肝脏有损伤

B. 病毒无复制, 无传染性

C. 有传染性

D. 肝脏有损伤, 无传染性

E. 病毒有复制, 有传染性, 肝脏有损伤

方正医学网答案: E

51. 男, 36 岁。2 天前阴茎龟头处出现簇集的针头大小水疱, 周围有红晕, 壁薄, 部分水疱

已破溃糜烂, 自觉疼痛, 伴发热、乏力。已婚, 1 周前有不洁性生活史。最可能的诊断是

A. 包皮龟头炎

B. 生殖器疱疹

C. 硬下疳

D. 扁平湿疣

E. 淋病

方正医学网答案: B

52. 女, 20 岁, 间断发热、双膝关节痛伴面部红斑 2 个月, 户外光照后加重。辅助检查: 血沉 60mm/h, 尿蛋白 (+++)。胸部 X 线显示双侧胸腔少量积液。最可能诊断是

A. 肾病综合征

B. 结核性胸膜炎

C. 类风湿关节炎

D. 慢性肾炎

E. 系统性红斑狼疮

方正医学网答案: E

53. 女, 70 岁, 高血压病史 20 年, 糖尿病史 5 年。长期服用依那普利 (5mg/bid)、非洛地平缓释片 (5mg/qd)、辛伐他

汀（20mg/qd）、二甲双胍（0.25/tid）阿卡波糖（50mg/tid），血压和血糖控制良好。近日患者出现全身肌肉酸痛、无力症状。最可能引起该不良反应的药物是

- A. 依那普利
- B. 非洛地平
- C. 辛伐他汀
- D. 二甲双胍
- E. 阿卡波糖

方正医学网答案：C

54. 女，16 岁。自幼反复发作性气喘，诊断为支气管哮喘。本次因急性发作而住院，经治疗症状消失，体征无异常，准备出院。出院后应采取的措施是

- A. 无须用药
- B. 规则吸入糖皮质激素，必要时吸入长效 β_2 受体激动药
- C. 必要时吸入糖皮质激素
- D. 规则口服糖皮质激素
- E. 规则口服 β_2 受体激动药

方正医学网答案：B

55. 水逆呕吐的特点是

- A. 呕吐黏稠苦水
- B. 吐势徐缓，吐物清晰

- C. 口干欲饮，饮后则吐
 - D. 喷射状呕吐
 - E. 朝食暮吐，暮食朝吐
- 方正医学网答案：C

56. 患者眩晕耳鸣，头目胀痛，面红目赤，急躁易怒，腰膝酸软，头重足轻，舌红，脉弦细数的临床意义是

- A. 肝火上炎
- B. 肝阳上亢
- C. 肝阴不足
- D. 肝气郁结
- E. 肝阳化风

方正医学网答案：B

57. 下列符合沉脉的脉象特征是

- A. 脉来迟慢，一息不足四至
- B. 脉来急促，一息五至以上而不满七至
- C. 往来流利，应指圆滑，如盘走珠
- D. 轻取即得，重按稍减而不空，举之有余，按之不足
- E. 轻取不应，重按始得，举之不足，按之有余

方正医学网答案：E

58. 下列症状不属于实证临床表现的是

- A. 五心烦热 B. 大便秘结
C. 小便不通 D. 痰涎壅盛
E. 腹痛拒按

方正医学网答案: A

59. 患者, 女, 55 岁。心悸、胸闷、气短, 活动后加剧已 3 年。面色淡白, 神疲乏力, 语声低微, 入夜不能安睡, 舌淡苔白, 脉弱。其证候是

- A. 心气虚证 B. 心阳虚证
C. 肺气虚证 D. 心血虚证
E. 肺阳虚证

方正医学网答案: A

60. 对诊断肾阳虚证最有意义的临床表现是

- A. 小便频数, 滑精早泄
B. 大便稀薄, 完谷不化
C. 下肢水肿, 凹陷不起
D. 畏寒肢冷, 精神萎靡
E. 腰膝冷痛, 精冷不育

方正医学网答案: E

61. 患者着凉后出现咳嗽, 痰稀

薄色白, 咽痒, 伴鼻塞, 恶寒, 发热, 苔薄白, 药物是

- A. 养阴清肺丸
B. 半夏糖浆
C. 橘红痰咳液
D. 通宣理肺丸
E. 橘红丸

方正医学网答案: D

62. 患者不寐多梦, 甚则彻夜不眠, 急躁易怒, 伴头晕头胀, 目赤耳鸣, 口干而苦, 不思饮食, 便秘溲赤, 舌红苔黄, 脉弦而数。其治法是

- A. 清化痰热, 和中安神
B. 补益心脾, 养血安神
C. 疏肝泻火, 镇心安神
D. 清肝利胆, 安神定志
E. 清心凉肝, 镇惊宁神

方正医学网答案: C

63. 治疗肝阳头痛宜选的中成药是

- A. 龙胆泻肝丸
B. 天麻钩藤颗粒
C. 脑安胶囊
D. 通心络胶囊

E. 半夏天麻丸

方正医学网答案：B

64. 湿热腰疼的症状为腰部疼痛，重着而热，暑湿阴雨天气加重，活动后或可减轻，身体困重，小便短赤。其常用中成药为

A. 小活络丸

B. 四妙丸

C. 正清风痛宁片

D. 舒筋活血片

E. 左归丸

方正医学网答案：B

65. 患者大便带血，喷射状出血，血色鲜红，肛门瘙痒，舌质红，苔薄黄，脉数。其证候是

A. 风热肠燥证

B. 湿热下注证

C. 气滞血瘀证

D. 脾虚气陷证

E. 热毒蕴结证

方正医学网答案：A

66. 患者月经先后无定期，经量

时多时少，色暗红，经行乳房胀痛，脘闷不舒，暖气食少，舌淡苔白，脉弦，其治法是

A. 补肾活血调经

B. 疏肝健脾调经

C. 疏肝理气调经

D. 益气活血调经

E. 补血活血调经

方正医学网答案：C

67. 患儿，见咳嗽不爽，痰黄黏稠，不易咯出，咽痛，鼻流浊涕，伴有发热、恶风、头痛。舌红，苔薄黄，脉浮数或指纹浮紫。应辨证为

A. 肺炎喘嗽，风热闭肺型

B. 肺炎喘嗽，痰热闭肺型

C. 肺炎喘嗽，毒热闭肺型

D. 热性哮喘

E. 痰热咳嗽

方正医学网答案：A

68. 漏肩风的针灸治法是

A. 通经活络，祛风止痛

B. 活血化痰，舒筋活络

C. 舒筋活络，活血通经

D. 祛邪通络，濡养筋脉

E. 祛风通络，疏调经筋

方正医学网答案：A

69. 暑湿感冒的治法是

A. 疏风肃肺

B. 疏风宣肺

C. 清暑祛湿解表

D. 辛温解表

E. 清暑解表

方正医学网答案：C

70. 心胸室闷，气短喘促，形体肥胖，肢体沉重，脘痞，痰多口黏，治法是

A. 疏肝理气，活血通络

B. 活血化瘀，通脉止痛

C. 通阳泄浊，豁痰宣痹

D. 滋阴益肾，养心安神

E. 益气温阳，活血通络

方正医学网答案：C

71. 眩晕之肝阳上亢证的治法是

A. 平肝潜阳，清火息风

B. 滋养肝肾，补气行血

C. 平肝潜阳，养心安神

D. 清肝泻火，降逆化痰

E. 补虚泻实，调整阴阳

方正医学网答案：A

72. 治疗胁痛之瘀血阻络证首选中成药是

A. 知柏地黄丸

B. 金匱肾气丸

C. 六味地黄丸

D. 逍遥丸

E. 血府逐瘀胶囊

方正医学网答案：E

73. 治疗呕吐之食滞胃脘证的治法宜

A. 疏肝理气，和胃降逆

B. 疏邪解表，化浊和中

C. 消食化滞，和胃降逆

D. 温补脾胃，益气回阳

E. 以上都不是

方正医学网答案：C

74. 瘀血腰痛的治法为

A. 清热利湿，舒筋止痛

B. 补肾壮阳，活血化瘀

C. 通络止痛，清热利湿

D. 散寒行湿，温经通络

E. 活血化瘀，通络止痛

方正医学网答案：E

75. 下列关于湿疮的说法错误的是

- A. 湿疮是一种过敏性炎症性皮肤病
- B. 特点是皮损对称分布
- C. 剧烈瘙痒，有渗出倾向
- D. 有明显季节性
- E. 反复发作，易成慢性

方正医学网答案：D

76. 风热闭肺型肺炎喘嗽重证治疗首选方剂是

- A. 银翘解毒丸
- B. 防风通圣丸
- C. 小儿咳喘灵口服液
- D. 小儿化食丸
- E. 通宣理肺丸

方正医学网答案：C

77. 治疗面瘫风寒证应加的配穴是

- A. 阳白、颧髎
- B. 风池、列缺
- C. 颊车、地仓
- D. 外关、曲池

E. 足三里、气海

方正医学网答案：B

78. 中成药与西药合用，可增加药物毒副作用的是

- A. 牛黄解毒丸（含雄黄）与酶制剂合用
- B. 小活络丹（含乌头碱）与氨茶碱合用
- C. 麻仁丸（含大黄）与胰酶、胃蛋白酶合用
- D. 黄连上清丸与乳酶生合用
- E. 龙牡壮骨颗粒与红霉素合用

方正医学网答案：B

79. 下列关于五苓散说法不正确的是

- A. 温阳化气，利湿行水
- B. 用于阳不化气、水湿内停所致的水肿
- C. 用于湿热下注，气滞水停，风水泛溢所致水肿
- D. 湿热下注，伤食所致泄泻不宜用
- E. 痰热犯肺，气喘咳嗽者不宜用

方正医学网答案：C

80. 具有消食化滞、泻火通便功效的中成药是

- A. 保和丸
- B. 麻仁润肠丸
- C. 小儿化食丸
- D. 补中益气丸
- E. 香砂养胃丸

方正医学网答案：C

81. 主治风邪蕴肺所致的急、慢性鼻炎的中成药是

- A. 鼻炎片
- B. 鼻炎康片
- C. 藿胆片
- D. 辛夷鼻炎片
- E. 鼻窦炎口服液

方正医学网答案：B

82. 中医典籍中有“天人合一”“天人相应”的观点。该观点所反映的医学模式为

- A. 神灵主义医学模式
- B. 整体医学模式
- C. 生物医学模式
- D. 生物-心理-社会医学模式
- E. 自然哲学医学模式

方正医学网答案：E

83. 患者张某，女，30 岁。单独进入到大型超市购物时，就会感到胸闷、出冷汗，所以一直回避这些场所。心理治疗师详尽地了解了患者焦虑的场合和回避的程度，训练患者学习放松技术，制定了一张等级表进行分级暴露，这种治疗方法为

- A. 快速暴露法
- B. 厌恶疗法
- C. 示范法
- D. 系统脱敏法
- E. 消退法

方正医学网答案：D

84. 女，72 岁。因消化性溃疡到医院就诊。医生为患者开出处方和化验单。因医嘱内容较多，为了更好地帮助患者记住医嘱要求，医生采取的措施不恰当的是

- A. 将医嘱内容进行归纳
- B. 重要的医嘱首先提出
- C. 请患者离开前复述医嘱
- D. 尽量使用专业术语叙述医嘱

E. 明确、具体地提出患者需进行的配合

方正医学网答案: D

85. 医疗机构在发现甲类传染病时, 对疑似病人在明确诊断前, 应在指定场所进行

- A. 访视
- B. 留验
- C. 单独隔离治疗
- D. 医学观察
- E. 就地诊验

方正医学网答案: C

86. 《执业医师法》规定, 医师在执业活动中应履行的义务之一是

- A. 在注册的执业范围内, 选择合理的医疗、预防、保健方案
- B. 从事医学研究、学术交流, 参加专业学术团体
- C. 参加专业培训, 接受继续医学教育
- D. 努力钻研业务, 更新知识, 提高专业水平
- E. 获得工资报酬和津贴, 享受国家规定的福利待遇

方正医学网答案: D

87. 患者陈某因手术效果不佳与医院发生争议, 要求复制病历资料。医院按照规定复制了病历资料, 并告知陈某另有部分病历资料不予复制, 只能在医患双方在场的情况下封存。

这部分病历资料是

- A. 病程记录
- B. 医学影像检查资料
- C. 住院志
- D. 手术及麻醉记录单
- E. 医嘱单

方正医学网答案: A

88. 青年李某, 右下腹疼痛难忍, 到医院就诊。经医师检查, 检验, 当即诊断为急性阑尾炎, 遂对其施行阑尾切除术。手术情况正常, 但拆线时发现伤口愈合欠佳, 有淡黄色液体渗出。手术医师告知, 此系缝合切口的羊肠线不为李某人体组织吸收所致, 在临床中少见。经过近 1 个月的继续治疗, 李某获得痊愈。根据《医疗事故处理

条例》规定，李某被拖延近 1 个月后才得以痊愈这一客观后果，应当属于

- A. 二级医疗事故
- B. 三级医疗事故
- C. 四级医疗事故
- D. 因患者体质特殊而发生的医疗意外
- E. 因不可抗力而造成的不良后果

方正医学网答案：D

89. 某县医院在处方检查中发现某医师开具了 3 张超常处方，医院领导询问其原因，该医师未能作出合理解释。于是，医院根据相关规定对其作出了处理。该处理是

- A. 责令暂停执业
- B. 限制处方权
- C. 取消处方权
- D. 记过
- E. 开除

方正医学网答案：B

90. 某村卫生室私自从“不法药贩”处购入药品用于患者的治

疗，险些造成患者死亡。事发后，经有关部门调查检测，认定该药品为假药。该认定依据的事实是

- A. 药品超过有效期
- B. 药品擅自添加着色剂
- C. 直接接触药品的包装材料未经批准
- D. 药品标签未标明有效期
- E. 药品所含成分与国家药品标准规定的成分不等

方正医学网答案：E

91. 三级预防措施中的第一级预防是指

- A. 病因预防
- B. “三早”预防
- C. 临床前期预防
- D. 临床期预防
- E. 病残预防

方正医学网答案：A

92. 目前不属于国家基本公共卫生服务项目的是

- A. 卫生监督协管
- B. 建立居民健康档案
- C. 0~6 岁儿童健康管理

D. I 型糖尿病患者健康管理

E. 传染病和突发公共卫生事件
报告和处理

方正医学网答案：D

93. 2018 年发生 450 例某病病人，在 2018 年年初已知有 550 例病人，年内因该病死亡 45 例，年初人口数 400 万，年末人口数 500 万，如果该病的发生和因该病死亡的事件均匀分布在全年，则 2018 年该病的病死率是

A. 2.0 B. 8.0

C. 10.0 D. 1.6

E. 4.5

方正医学网答案：E

94. 某地区某种疾病的发病率明显超过历年的散发发病率水平，则认为该病

A. 大流行 B. 散发

C. 有季节性 D. 爆发

E. 流行

方正医学网答案：E

95. 一个生物学特征（年龄、性

别、身体形态等），在健康的
决定因素中属于

A. 卫生服务因素

B. 生物遗传因素

C. 个人生物学特征

D. 文化社会环境因素

E. 行为和生活方式因素

方正医学网答案：C

96. 某女性患者，45 岁，体检结果显示：血压 180/100mmHg，体重 68Kg，身高 160cm（BMI=26.6），甘油二酯 4.5mmol/L，胆固醇 5.1mmol/L。该女患者营养状况判断为

A. 肥胖 B. 严重肥胖

C. 消瘦 D. 超重

E. 正常

方正医学网答案：D

97. 男，40 岁。家禽养殖户。因接触死禽后出现发热、咳嗽等症状，随后出现呼吸困难到村卫生室就诊，医生初步诊断为疑似人感染高致病性禽流感。该医生正确的处理措施是

A. 就地治疗，治疗无效再转诊

- B. 让家属接回家，居家隔离
C. 立即进行疫情报告并转诊
D. 立即转诊，不用报告疫情
E. 疑似病例等确诊后再转诊
方正医学网答案：C

98. 婴儿，6 月龄。5 月龄的疫苗还未接种，按照国家免疫规划程序，此时应补种和正常接种的疫苗是

- A. 脊灰灭活疫苗、百白破疫苗
B. 百白破疫苗、乙肝疫苗
C. 百白破疫苗、水痘疫苗
D. 卡介苗、乙肝疫苗
E. 乙肝疫苗、乙脑疫苗

方正医学网答案：B

99. 一小儿身高 85cm，前囟已闭，头围 48cm，乳牙 20 枚，已会跳并能用简单的语言表达自己的需要，对人、事有喜乐之

分。此小儿的年龄最大的可能是

- A. 1 岁 B. 1 岁半
C. 2 岁 D. 3 岁
E. 3 岁半

方正医学网答案：C

100. 医生在对某高血压患者随访的过程中，第 1 次随访收缩压为 150mmHg，间隔 3 个月后第 2 次随访时收缩压为 155mmHg。

以下处理符合规范要求的是

- A. 继续观察，3 个月后再随
B. 不予处理，信息报告乡卫生院
C. 转诊至上级医院，2 周内随访
D. 转诊至上级医院，1 个月内随访
E. 转诊至上级医院，2 个月内随访

方正医学网答案：C