



临床执业（含助理）医师笔试

考前 (临床)

100 题



多看一题



多考一分

FZ EDUCATION
方正教育



扫码获取分校联系方式



关注“方正网校”获取更多资讯

全国加盟：胡老师 17837886667

临床执业（含助理）医师资格考试

考前 100 题

1. 男性，29岁，大量饮酒后呕吐鲜血一小时，量约800ml，查体P110次/分，血压92/65mmHg，神志清楚，未见肝掌，蜘蛛痣，腹软，无压痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音12次/分，为明确诊断最有意义的检查。

- A. 腹部CT
 - B. 上消化道X线钡餐造影
 - C. 腹部X线平片
 - D. 腹部B超
 - E. 胃镜
- 方正医学网答案：E

2. 女，45岁。1年来久站或长时间行走时觉左下腹部胀痛不适。查体：T36.5℃，P80次/分，R18次/分，BP120/80mmHg。双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心律齐。腹软，无压痛，立位左腹股沟韧带下方内侧突起半球形肿物，平卧时可缩小，咳嗽时无明显冲击感，压迫内

环后肿物仍可复出。该患者最适宜的手术方法是

- A. Shouldice 法疝修补术
- B. McVay 法疝修补术
- C. Bassini 法疝修补术
- D. Halsted 法疝修补术
- E. Ferguson 法疝修补术

方正医学网答案：B

3. 关于早期食管癌的症状描述正确的是

- A. 持续胸背痛
- B. 吞咽困难
- C. 进食呛咳
- D. 声音嘶哑
- E. 进食梗噎

方正医学网答案：E

4. 男，28岁，中上腹反复疼痛3年，突发刀割样剧痛2小时，平素腹痛于饥饿时明显，进食后稍缓解，未规律治疗，手术中探查发现十二指肠球部后壁穿孔，直径约5mm，最佳的手术方式是

A. 胃大部切除胃空肠

roux-en-y 吻合

B. 毕 II 式胃大部切除术

C. 毕 I 式胃大部切除术

D. 穿孔修补术

E. 胃全切除术

方正医学网答案：D

5. 男，30岁。因消化性溃疡行胃大部切除、毕II式吻合术治疗。术后第5天，突发在上腹剧痛。查体：心肺未见明显异常，手术切口无明显渗出，全腹肌紧张、压痛（+），以右上腹为著。最可能的诊断是

A. 十二指肠残端破裂

B. 急性胆囊炎并穿孔

C. 输入段肠袢梗阻

D. 胃肠吻合口出血

E. 急性胰腺炎

方正医学网答案：A

6. 男，70岁。腹部绞痛伴腹胀4小时，无呕吐。下消化道X线钡剂造影见直肠上段钡剂受阻，钡影尖端呈“鸟嘴”形，最可能的诊断是

A. 肠套叠

B. 乙状结肠癌

C. 乙状结肠扭转

D. 直肠癌

E. 小肠扭转

方正医学网答案：C

7. 女，50岁。间歇性右上腹痛伴皮肤巩膜黄染半年，再次发作2天。查体：T36.5℃，P80次/分，R18次/分，

BP120/80mmHg。皮肤巩膜明显黄染，未见肝掌，蜘蛛痣。右上腹压痛，无明显肌紧张和反跳痛。B超检查示胆囊内多发泥沙样结石，胆总管略扩张。最恰当的手术方式是

A. 胆肠吻合术

B. 胆囊切除、胆总管探查术

C. 胆囊造口、胆总管探查术

D. 胆囊造瘘术

E. 腹腔镜胆囊切除术

方正医学网答案：B

8. 男，38岁，暴饮暴食后持续左腹胀痛，恶心，呕吐3小时，呕吐后症状无缓解，体温

37.5°C，心率 112 次/分，呼吸 30 次/分，血压 90/65mmHg，神志清，皮肤巩膜无黄染，腹平坦，上腹压痛，无反跳痛，轻度肌紧张，肝脾肋下未触及，肠鸣音 3 次/分，血淀粉酶 400U/L，为明确诊断，首选检查是

- A. 腹部立卧位 X 线平片
- B. MRCP
- C. 上消化道 X 线钡剂造影
- D. 胃镜
- E. 腹部增强 CT

方正医学网答案：E

9. 男，60 岁，腹泻、便秘交替，粪便带血 6 个月，体重减轻 5kg。查体：T36.5°C，P80 次/分，R18 次/分，BP120/80mmHg，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心率 80 次/分，律齐，腹软，无压痛。血常规：Hb120g/L，WBC15.6×10⁹/L，NO.86。结肠镜检查于乙状结肠见溃疡性病灶，超声内镜提示病灶侵犯肠壁浆膜下层，肠系膜可扪及 4 个区域淋巴结肿大。PET 显示全

身其他部位未见癌转移。该病人 TNM 分期考虑为

- A. T₃ N₂ M₀
- B. T₂ N₃ M₀
- C. T₄ N₃ M₀
- D. T₃ N₃ M₀
- E. T₂ N₂ M₀

方正医学网答案：A

10. 女，50 岁，上腹部隐痛不适 4 月余，呕血 7 小时。查体：皮肤、巩膜黄染，睑结膜稍苍白，腹部饱满，可见腹壁静脉曲张，腹软，无压痛，肝肋下 3cm，脾肋下 5cm，肠鸣音正常，移动性浊音阳性。双下肢轻度水肿。既往乙肝病史 10 年，未口服抗病毒药。胃镜检查可见食管静脉蚯蚓状曲张，有一活动性出血。首选治疗是

- A. 三腔二囊管压迫止血
- B. 经胃镜食管曲张静脉套扎术
- C. 经胃镜硬化剂注射
- D. 艾司奥美拉唑持续泵点
- E. 生长抑素持续泵点

方正医学网答案：B

11. 男，36 岁。皮肤黄染进行性加重 1 个月。伴上腹胀、隐痛、

食欲差、乏力，10 天前感皮肤瘙痒，大便呈陶土样。查体：消瘦，巩膜黄染，腹部稍胀，无明显压痛，未触及包块，胆囊无肿大，血 AFP $5 \mu\text{g}/\text{L}$ 。最可能的诊断是

- A. 肝门部胆管癌
- B. 胆囊癌
- C. 胆总管下段癌
- D. 肝癌
- E. 胰头癌

方正医学网答案：A

12. 女性，52岁，大便带血3个月，排便有下坠感，里急后重，直肠镜检查见距齿状线8cm处有一 $3\text{cm} \times 3\text{cm}$ 肿块，菜花状，质脆，易出血，病理诊断为直肠腺癌。若选择手术，最佳术式为

- A. 经腹会阴直肠癌根治术
- B. 经腹直肠癌切除术
- C. 经腹直肠癌切除、人工肛门、远端封闭手术
- D. 拉下式直肠癌切除术
- E. 局部切除加放疗术

方正医学网答案：B

13. 女，65岁。阵发性腹痛、腹胀、停止排气排便2天。既往有类似发作，程度较轻，未诊治。查体：P100次/分，BP $110/70\text{mmHg}$ ，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心率100次/分，心律齐，腹肌紧张，压痛明显，反跳痛阳性，移动性浊音阳性。最可能的诊断是

- A. 不全性粘连性肠梗阻
- B. 单纯性机械性肠梗阻
- C. 绞窄性肠梗阻
- D. 麻痹性肠梗阻
- E. 完全性高位肠梗阻

方正医学网答案：C

14. 男，48岁，一小时前被机动车撞伤腹部，诉腹痛，程度逐渐加重。查体：T 38.5°C ，P90次/分，R20次/分，BP $100/74\text{mmHg}$ 。痛苦貌，腹壁完整，全腹压痛、反跳痛、肌紧张，以脐周为著。腹部B超：肠间少量积液，肝周、膈下未见明显异常。导尿时导出黄色尿液300ml。患者最有可能发生了

- A. 肝破裂 B. 脾破裂
C. 小肠破裂 D. 肾破裂
E. 胰腺破裂

方正医学网答案： C

15. 患者男性，32岁，反复间断性腹痛、腹泻10年，大便3~4次/日，多为不成形黄色便，不含黏液及脓血，排便后腹痛可缓解，查体：T36.8℃，体形消瘦，腹部平软，无压痛反跳痛。结肠镜检查未见明显异常。考虑治疗的药物首选

- A. 匹维溴铵 B. 异烟肼
C. 泊尼松龙 D. 噩唑酮
E. 柳氮磺胺吡啶

方正医学网答案： A

16. 女，28岁。左上肢不慎被开水烫伤1小时。疼痛明显。查体：左前臂约患者手掌大小皮肤红肿明显，有大小不一水疱，水疱无破裂，创面无明显异常感染，关于患者的治疗正确的是

- A. 抽去水疱液，消毒包扎
B. 去除水疱皮，消毒包扎

- C. 注射破伤风类毒素
D. 创面周围注射止痛药物
E. 消毒后局部加压包扎

方正医学网答案： A

17. 胃大部切除术后切口红肿，无脓肿以及破溃，未裂开，最终伤口愈合。伤口愈合程度的分级是

- A. I /甲 B. II /甲
C. III /甲 D. III /乙
E. II /乙

方正医学网答案： E

18. 男孩，3岁，体重16kg，双下肢被开水烫伤。查体：BP 85/60mmHg，烦躁不安。双下肢（包括臀部）II°烧伤，尿量15ml/h。第一个24小时应补充胶体液的量为

- A. 500ml B. 800ml
C. 400ml D. 600ml
E. 700ml

方正医学网答案： D

19. 女，43岁。左乳头溢液10余天。无不适症状。查体：乳

房视诊无异常发现，未扪及肿块，无压痛，按压左乳晕外上方可见黄褐色溢液。门诊首选的检查是

- A. 热图像检查
- B. 近红外线扫描
- C. 溢液涂片细胞学检查
- D. B 型超声检查
- E. 钼靶 X 线摄片

方正医学网答案：C

20. 以下不是有机磷农药中毒的毒蕈碱样作用的是

- A. 肌肉强直性痉挛
- B. 心血管活动受抑制
- C. 瞳孔括约肌、睫状肌兴奋
- D. 消化道、呼吸道腺体兴奋
- E. 支气管、胃肠道平滑肌兴奋

方正医学网答案：A

21. 男，32岁。炸石作业时不慎炸伤右大腿5小时。伤后出血约400ml。查体：T36.5°C，P80次/分，R18次/分，BP110/80mmHg，神志清楚，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心律齐，腹软，无压痛。右大腿可

见一长约10cm不规则皮肤伤口，肌肉部分破损。对该患者处理错误的是

- A. 清创后一期缝合伤口
- B. 扩创、引流后延期缝合
- C. 同时应用抗生素和 TAT
- D. 清创时探查深部损伤情况
- E. 伤口近心端扎止血带，送医院

方正医学网答案：A

22. 女，40岁，右乳腺癌2.3cm×4.5cm×4.2cm，局部侵犯胸壁，不可推动，右侧腋窝扪及5枚质硬淋巴结，互相粘连融合，未发现远处转移，该患者临床分期是

- A. T₁ N₂ M₀
- B. T₂ N₂ M₀
- C. T₃ N₂ M₀
- D. T₄ N₁ M₀
- E. T₄ N₂ M₀

方正医学网答案：E

23. 男，28岁，右大腿清创缝合术后6天发热，局部伤口红肿，范围较大，疼痛明显。伤口局部见稀薄脓液，淡红色，量多，无腥味。最可能感染的致病菌

是

- A. 大肠埃希菌
- B. 铜绿假单胞菌
- C. 溶血性链球菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 无芽孢厌氧菌

方正医学网答案：C

24. 女，43岁，既往肺结核病史经规范治疗后痊愈。4天前出现发热伴咳嗽咳痰，当地医院怀疑肺结核复发，予以口服利福平治疗，3天前出现全身肌肉及腰部酸痛，尿蛋白++，红细胞++，白细胞++，超声示双肾轻度肿大，实质性回声增强，最可能发生的是

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 慢性肾小球肾炎
- D. 急性间质性肾炎
- E. 泌尿系结核

方正医学网答案：D

25. 男性，30岁，左侧阴囊肿物，质硬，托举有沉重感，透光试验阴性，诊断为

A. 睾丸扭转

- B. 交通性鞘膜积液
- C. 睾丸肿瘤
- D. 精索鞘膜积液
- E. 睾丸鞘膜积液

方正医学网答案：C

26. 男，35岁。B超发现右输尿管上段结石，大小 $1.2\text{cm} \times 0.8\text{cm}$ ，合并轻度右肾积水。无发热，静脉尿路造影（IVU）显示右输尿管上段结石，右肾轻度积水，输尿管显影。首选的治疗方法是

- A. 体外冲击波碎石
- B. 输尿管镜碎石取石
- C. 经皮肾镜碎石取石
- D. 开放输尿管切开取石
- E. 腹腔镜输尿管切开取石

方正医学网答案：A

27. 男，45岁。地震中受挤压10小时后获救，出现酱油色尿。查体：BP $105/60\text{mmHg}$ ，左下肢肿胀、压痛。尿隐血（++++），尿沉渣镜检 RBC $0 \sim 2/\text{HP}$ 。Scr $280 \mu\text{mol/L}$ ，K $^{+} 7.5\text{mmol/L}$ ，

肌酸激酶 3500IU/L(正常值 0~200IU/L)。首要的急救治疗是
A. 利尿 B. 血液透析
C. 抗感染 D. 大量补液
E. 肿胀患肢切开减压
方正医学网答案：B

28. 男，38岁。右上臂刀割伤3小时。查体：T36.9℃，P102次/分，R20次/分，BP120/70mmHg。双肺呼吸音清，未闻及干湿啰音，心律齐，未闻及杂音，腹软，无压痛，右手小指及环指的小指半侧感觉明显减退，手指内收障碍。损伤的神经是

- A. 桡神经 B. 肌皮神经
C. 腋神经 D. 正中神经
E. 尺神经

方正医学网答案：E

29. 女，78岁。跌倒右髋受伤2小时，局部疼痛，活动受限，患肢缩短，轴向叩击痛（+），X线片显示右股骨颈基底部骨皮质连续性中断，断段嵌插，Pauwells角25°，一般状态差，

既往高血压，肺心病，糖尿病史30余年，心功能IV级，最佳治疗方案是

- A. 闭合复位内固定
B. 切开复位内固定
C. 下肢中立位皮牵引6~8周
D. 转子间截骨矫正力线
E. 人工关节置换术
方正医学网答案：C

30. 男，23岁，高处摔下后右手着地，伤后右前臂畸形，活动受限。查体：右前臂畸形，肿胀，桡骨中下1/3交界处可触及骨擦感，腕部可触及异常凸起的尺骨远端，未及尺骨摩擦感，最可能的诊断是

- A. Smith 骨折
B. Monteggia 骨折
C. Colles 骨折
D. Barton 骨折
E. Galeazzi 骨折
方正医学网答案：E

31. 胎头矢状缝与母体骨盆入口左斜径一致，其胎位是
A. 枕左横 B. 枕右横

C. 枕左前 D. 枕右后

E. 枕左后

方正医学网答案：E

32. 初产妇，30岁，妊娠38周，宫口开大10cm，头先露，S+3，3小时后查胎心110次/分，最可能的诊断是

- A. 第二产程停滞
- B. 第二产程延长
- C. 活跃期停滞
- D. 活跃期延长
- E. 潜伏期延长

方正医学网答案：B

33. 患者，女，28岁。停经3个月，早孕反应消失，阴道少量流血2天。妇科检查：宫口闭，子宫如妊娠8周大，质软，双侧附件区未触及异常。该患者最可能的诊断是

- A. 完全流产
- B. 难免流产
- C. 流产感染
- D. 稽留流产
- E. 先兆流产

方正医学网答案：D

34. 女，26岁。结婚2年未孕，

现停经41天，阴道少量流血6小时，今晨突感下腹部剧烈疼痛，伴明显肛门坠胀感，BP 66/44mmHg，妇科检查：宫颈举痛，摇摆痛明显，子宫稍大、稍软。左侧附件区压痛明显。本例恰当的处理措施是

- A. 输液输血，同时行剖腹探查术
- B. 立即行剖腹探查术
- C. 输液输血，观察病情进展
- D. 立即进行刮宫术
- E. 待纠正休克后行剖腹探查术

方正医学网答案：A

35. 女，30岁，初产妇，妊娠35周，恶心、呕吐、乏力伴皮肤黄染、瘙痒1周。结合化验检查诊断为妊娠合并乙型病毒性肝炎（重型）除保肝治疗外，应采取的措施

- A. 尽快使用子宫动脉栓塞术
- B. 尽快行剖宫产术
- C. 尽快催产素促进宫颈成熟
- D. 继续妊娠至37周
- E. 尽快利凡诺尔腔内引产

方正医学网答案：B

36. 32岁，G₂P₁，孕35周，剖宫产史。自30周起间断少量阴道流血，无腹痛。昨晚突然阴道出血，因故未及时就诊。今日就诊途中下腹部突发撕裂样剧痛，伴有阴道流血。查体：全腹部压痛、反跳痛、移动性浊音（+），腹壁可清楚触及胎体。最可能的诊断是

- A. 胎盘早剥
- B. 强直性子宫收缩
- C. 先兆子宫破裂
- D. 子宫破裂
- E. 肌瘤红色变性

方正医学网答案：D

37. 女，35岁，妊娠22周，腹痛两周，加重伴发热一天无阴道流血，既往子宫肌瘤病史5年。查体：未触及宫缩，B超示子宫前壁一个10cm实质性凸起，最可能诊断是

- A. 子宫肌瘤合并感染
- B. 子宫肌瘤合并肉瘤样变
- C. 子宫肌瘤合并玻璃样变
- D. 子宫肌瘤合并红色样变

E. 子宫肌瘤合并囊性变

方正医学网答案：D

38. 女，30岁。7个月前孕48天行人工流产术，术后未来月经，雌、孕激素试验均阴性，闭经的原因应是

- A. 卵巢性闭经
- B. 垂体性闭经
- C. 下丘脑性闭经
- D. 子宫性闭经
- E. 难以确定

方正医学网答案：D

39. 患者，女，48岁。放置宫内节育器（IUD）10年，不规则阴道流血3个月。妇科检查：宫颈光滑。宫颈细胞学检查无异常。首选处理方法

- A. 止血药治疗
- B. 抗感染治疗
- C. 取出IUD+诊断性刮宫术
- D. 取出IUD+抗感染治疗
- E. 人工周期治疗

方正医学网答案：C

40. 一健康儿童体检结果为：身

高 115cm，体重 20kg，尚未开始换牙，腕部骨化中心数为 7 个，按照小儿生长发育的一般规律，其最可能的年龄是
A. 6 岁 B. 8 岁
C. 4 岁 D. 5 岁
E. 7 岁

方正医学网答案：A

41. 男婴，生后 7 天，足月生产，出生无异常。因近 4 天出现皮肤黄染并渐加重就诊。精神吃奶好，无发热。查体：反应好，呼吸平稳，皮肤黄染，前囟平软，心肺正常，肝肋下 2cm，四肢肌张力正常。血清总胆红素 $188 \mu\text{mol/L}$ ，直接胆红素 $18 \mu\text{mol/L}$ 。该婴儿最可能的诊断是
A. 生理性黄疸
B. 溶血性黄疸
C. 母乳性黄疸
D. 新生儿胆道闭锁
E. 新生儿肝炎

方正医学网答案：A

42. 患者，男，1 岁。发热 9 天。查体：T39℃，眼结膜充血，口

唇鲜红、干裂，舌呈草莓样，皮肤有浅红色斑丘疹，右颈淋巴结蚕豆大，双肺呼吸音粗，心率 130 次/分，腹软，肝、脾无肿大，指、趾端少许膜状脱皮。实验室检查：血 WBC $19 \times 10^9/\text{L}$ ，NO. 72，LO. 28，PLT $420 \times 10^9/\text{L}$ ，ESR 120mm/h 。最可能的诊断为

- A. 猩红热
 - B. 幼年类风湿关节炎
 - C. 染色单核细胞增多症
 - D. 川崎病
 - E. 金黄色葡萄球菌败血症
- 方正医学网答案：D

43. 男孩，1 岁。未接种过卡介苗，其父患活动性肺结核，时有咯血。目前小儿与父母生活在一起，但无任何症状。小儿胸部 X 线片未见异常，PPD 试验（+）。除隔离父亲外，宜对小儿采取的措施是
A. 口服异烟肼，疗程 6~9 月
B. 继续观察，暂不作任何处理
C. 口服利福平，疗程 1 年
D. 口服利福平+异烟肼，疗程 6

个月

E. 立即接种卡介苗

方正医学网答案：A

44. 男婴，8 个月。腹泻 3 天，排便 10 余次/日，蛋花汤样伴少量黏液，呕吐，4~5 次/日。嗜睡，口干，尿量少。体检：精神萎靡，皮肤干燥、弹性差，眼窝及前囟明显凹陷，哭时泪少。血钠 132mmol/L，血钾 4mmol/L。该患儿诊断为婴儿腹泻合并

A. 轻度等渗性脱水

B. 中度等渗性脱水

C. 重度等渗性脱水

D. 中度高渗性脱水

E. 重度高渗性脱水

方正医学网答案：B

45. 男，1 岁。高热 6 天，精神差，频繁咳嗽，阵发性喘憋。体检：鼻翼扇动，吸气性凹陷，两肺叩诊稍浊，呼吸音减低，双肺闻及少量中湿啰音。白细胞 $9.0 \times 10^9/L$ 。胸部 X 线摄片示双肺片状密度较淡阴影。最

可能的诊断为

A. 金黄色葡萄球菌肺炎

B. 呼吸道合胞病毒肺炎

C. 腺病毒肺炎

D. 肺炎支原体肺炎

E. 肺炎链球菌肺炎

方正医学网答案：C

46. 男孩，5 岁。出生后数月逐渐出现青紫，活动后加重。查体：胸骨左缘第 3 肋间可闻及 3/6 级喷射性收缩期杂音，胸部 X 线片示心脏稍有增大，心尖圆钝上翘，肺动脉段凹陷，上纵隔增宽，肺门血管影缩小，肺野透亮度增加。最可能的诊断是

A. 室间隔缺损

B. 动脉导管未闭

C. 法洛四联症

D. 完全性大动脉错位

E. 房间隔缺损

方正医学网答案：C

47. 女孩，6 岁。体重 20kg。颜面及四肢凹陷性水肿 3 个月。

查体：血压：130/80 mmHg。尿

常规：红细胞 8 个/HP。24 小时尿蛋白定量为 1.2g。血清白蛋白 25g/L。该患儿最可能的诊断是

- A. 单纯性肾病综合征
- B. 肾炎性肾病综合征
- C. 急性肾小球肾炎
- D. 急进性肾小球肾炎
- E. 慢性肾小球肾炎

方正医学网答案：B

48. 男，63 岁，吸烟史 35 年，家属发现患者呼之不应半小时急送医院。有 COPD 病史 20 年。查体：BP150/70mmHg，浅昏迷状态，球结膜水肿，双肺可闻及干湿啰音， $A_2 < P_2$ ，下肢水肿。为明确诊断首选的检查是

- A. 肺功能
- B. 胸部 X 线片
- C. 超声心动图
- D. 动态心电图
- E. 动脉血气分析

方正医学网答案：E

49. 女，35 岁。支气管哮喘史 20 年，近 2 周来出现活动耐力

下降。有时夜间憋醒，口服“氨茶碱”可逐渐缓解。查体：双肺散在哮鸣音。最重要的治疗措施是规律使用

- A. 糖皮质激素气雾剂
- B. 长效 β_2 受体激动剂
- C. 短效 β_2 受体激动剂
- D. 胆碱能受体抑制剂
- E. 联合吸入糖皮质激素和长效 β_2 受体激动剂

方正医学网答案：E

50. 男，52 岁。突发呼吸困难 4h。既往糖尿病、高血压病史 10 年。查体：R32 次/min，BP100/70mmHg，颈静脉怒张，双肺呼吸音清，未闻及干湿啰音。心率 105 次/min， $P_2 > A_2$ 。CTPA 示右下肺动脉内充盈缺损。

首选治疗措施是

- A. 口服华法林
- B. 静脉滴注 rt-PA
- C. 肺动脉内注射尿激酶
- D. 皮下注射低分子肝素
- E. 手术取栓

方正医学网答案：D

51. 男，68岁，咳嗽气促1天。既往肺心病病史6年。血气分析：pH7.188，PaCO₂75 mmHg，PaO₂50mmHg，HCO₃⁻27.6mmol/L，BE-5mmol/L。考虑酸碱失衡类型是
A. 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒
B. 单纯呼吸性酸中毒
C. 单纯代谢性酸中毒
D. 单纯代谢性碱中毒
E. 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒

方正医学网答案：E

52. 男，55岁。持续胸痛10h收入院。查体：BP120/80mmHg，高枕卧位，双肺可闻及较多细湿啰音，啰音范围大于1/2肺野。心电图示V₂~V₄导联ST段抬高0.2~0.4mV。心功能分级是
A. NYHA II 级
B. NYHA III 级
C. Killip I 级
D. Killip IV 级
E. Killip III 级

方正医学网答案：E

53. 男，50岁。突发心悸1h。20年前曾诊断为“预激综合征”。查体：BP70/50mmHg，心率190次/min，律绝对不齐。心电图示QRS波宽大畸形。该患者最佳治疗措施是
A. 静脉推注维拉帕米
B. 颈动脉窦按摩
C. 同步直流电复律
D. 静脉推注毛花苷丙
E. Valsalva 动作

方正医学网答案：C

54. 男，70岁，3小时前突发胸骨后剧烈疼痛，伴出汗乏力，口服硝酸甘油无显著缓解。查体：BP140/70mmHg，双肺未闻及啰音，HR90次/min，未闻及杂音。心电图显示V₁~V₅ ST弓背向上抬高0.3~0.5mV。为进行心肌再灌注，应选用的药物是
A. 美托洛尔 B. 阿托伐他汀
C. 阿替普酶 D. 阿司匹林
E. 瑞洛昔利

方正医学网答案：C

55. 女，43岁。诊断风湿性心脏瓣膜病20余年。查体：心前区未触及震颤，胸骨左缘第3肋间可闻及舒张期叹气样杂音，心尖部可闻及舒张早中期杂音，S₁减弱。诊断是

- A. 主动脉瓣相对性狭窄伴二尖瓣相对性狭窄
- B. 主动脉瓣关闭不全伴二尖瓣相对性狭窄
- C. 主动脉瓣关闭不全伴二尖瓣器质性狭窄
- D. 主动脉瓣器质性狭窄伴二尖瓣器质性狭窄
- E. 主动脉瓣相对性狭窄伴二尖瓣器质性狭窄

方正医学网答案：B

56. 男，36岁，反复活动后心悸气短2年余，加重伴夜间阵发性呼吸困难2天。既往无明确心脏病史，无吸烟饮酒史，无糖尿病及甲亢病史。查体：BP100/70mmHg，双肺底可闻及少许湿啰音。心率112次/分，律齐，心尖区可闻及2/6级收

缩期吹风样杂音。心电图示非特异性ST-T改变。超声心动图示左室舒张末期内径62mm(≤52)，室间隔厚9mm(8~11)，弥漫性室壁运动减弱，LVEF36%。最可能诊断是

- A. 急性冠脉综合症
- B. 肥厚性心肌病
- C. 缺血性心肌病
- D. 扩张性心肌病
- E. 急性心肌炎

方正医学网答案：D

57. 男，55岁，左下肢长时间站立加重，休息后减轻。既往高血压病史5年。查体：左小腿内侧局部皮肤色素沉着。大隐静脉瓣膜功能试验(+)。最可能诊断是

- A. 下肢静脉曲张
- B. 动静脉瘘
- C. 血栓性静脉炎
- D. 冠心病
- E. 浅静脉炎

方正医学网答案：A

58. 女，28岁。发热、皮肤出血

点 2 周。查体：贫血貌，四肢皮肤散在出血点，胸骨压痛（+），左肺可闻及少许湿啰音。腹软，脾肋下 1cm。血常规：Hb71g/L，WBC3.0×10⁹/L，Plt6×10⁹/L。骨髓细胞学检查见原始细胞占比 0.90。细胞化学染色：MPO（-），PAS（+），骨髓染色体检查为正常核型。首选的治疗是

- A. 全反式维 A 酸口服液
- B. VDLP 方案化疗
- C. 甲磺酸伊马替尼口服
- D. HA 方案化疗
- E. 环孢素口服

方正医学网答案：B

59. 男，12岁。患再生障碍性贫血半年，因重度贫血，需要反复输血。应输注的血液成分是

- A. 洗涤红细胞
- B. 去除白细胞的红细胞
- C. 悬浮红细胞
- D. 浓缩红细胞
- E. 冰冻红细胞

方正医学网答案：B

60. 女，35岁，体检发现颈前肿块 2 个月，无明显症状。查体：甲状腺左叶有一硬性肿物 1.5cm×1cm，随吞咽活动，无压痛，颈部无肿大结节。B 超示：左叶上级 1.5cm×1cm，低回声团，边界不清，血流丰富，纵横比大于 1。实验室检查：FT₃36.46，FT₄16.5，TSH2.5，诊断为

- A. 桥本甲状腺炎
- B. 甲状腺癌
- C. 甲状旁腺癌
- D. 甲状腺腺瘤
- E. 结节性甲状腺肿

方正医学网答案：B

61. 男，60岁，嗜睡，乏力 2 天。近期天热喝含糖饮料较多。既往高血压和糖尿病病史，随机血糖 41.8mmol/L。最有可能的诊断是

- A. 高血压脑病
- B. 高渗性非酮症糖尿病昏迷
- C. 糖尿病酮症酸中毒
- D. 脑出血
- E. 低血糖

方正医学网答案：B

62. 男，70岁。双手指间关节疼痛2年，每日晨僵数分钟。查体：T36.6℃，P70次/分，R18次/分，BP100/70mmHg，皮肤未见皮疹，心肺腹未见异常，双手远端指间关节Heberden结节，双手近端指间关节骨性膨大。血沉正常，ASO（-），RF（-）。

可选择的一线治疗药物是

- A. 青霉素
- B. 秋水仙碱
- C. 柳氮磺吡啶
- D. 双氯芬酸钠
- E. 甲氨蝶呤

方正医学网答案：D

63. 男，44岁。9年前体检时发现HBsAg阳性，当时ALT正常，未定期复查。近4年ALT反复升高，未予抗病毒治疗。3周前因过劳出现食欲下降、尿黄、齿龈出血。治疗后，上述症状逐渐加重且出现腹胀、尿量减少。近3d睡眠颠倒，有时语无伦次。查体：注射部位有瘀斑，

腹部移动性浊音阳性，扑翼样震颤阳性。化验：ALT176U/L，TBil432μmol/L，凝血酶原活度38%。最可能的诊断是

- A. 慢性乙型肝炎
- B. 慢性重型乙型肝炎
- C. 慢性乙型肝炎急性发作
- D. 亚急性重型乙型肝炎
- E. 乙肝肝硬化，活动期，失代偿期

方正医学网答案：B

64. 男，30岁。晨起四肢无力1周，大小便正常。病前1周有“上感”史。查体：双眼闭合无力，双侧咽反射迟钝，四肢肌力1~2级，肌张力低，腱反射消失，无明显感觉障碍。最可能的诊断是

- A. 多发性肌炎
- B. 重症肌无力
- C. 吉兰-巴雷综合征
- D. 周期性瘫痪
- E. 急性脊髓炎

方正医学网答案：C

65. 患者，男性，车祸伤及头部，

伤后出现左侧鼻唇沟变浅，鼻出血，左耳听力下降，左外耳道流出淡血性液体。诊断首先考虑

- A. 颅前窝骨折
- B. 颅中窝骨折
- C. 颅后窝骨折
- D. 左颞骨骨折
- E. 脑震荡

方正医学网答案：B

66. 女，67岁。车祸后即昏迷，伤后2h被送往医院。查体：昏迷状态，左顶枕部有一直径4cm头皮血肿，右侧瞳孔散大，对光反射消失，左侧肢体肌张力增高，病理反射阳性。头颅CT示右额颞部骨板下新月形高密度影。该患者最可能的诊断是

- A. 右额颞急性硬脑膜下积液，脑疝
- B. 右额颞急性硬脑膜外血肿，脑疝
- C. 右额颞颅内血肿，脑疝
- D. 右额颞脑挫伤，脑疝
- E. 右额颞急性硬脑膜下血肿，脑疝

方正医学网答案：E

67. 女，28岁。突发剧烈头痛、呕吐5h。查体：神志清楚，躁动，颈项强直，深反射亢进，克氏征阳性。头颅CT示侧裂池、环池内高密度影。首先考虑的诊断是

- A. 硬脑膜下血肿
- B. 脑积水
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 脑膜炎
- E. 脑炎

方正医学网答案：C

68. 男，71岁。进行性右手震颤、动作缓慢3年，翻身困难1年。查体：面具脸，右手静止性震颤，四肢肌张力增高，行走缓慢。有前列腺增生、轻度肾功能不全和房颤病史。对该患者最恰当的治疗药物是

- A. 安坦
- B. 复方左旋多巴
- C. 丙炔苯丙胺（司来吉兰）
- D. 金刚烷胺
- E. 溴隐亭

方正医学网答案：B

69. 男，36岁。3年内抽搐发作20余次，表现为无诱因的口角和右上肢抽搐，意识尚清，但不能对答，约5~10s后意识丧失伴全身抽搐。持续30s后，逐渐停止。事后不能回忆发作过程。发作间期的神经系统检查和常规脑电图检查未见异常。针对该患者的治疗首选药物是
A. 氯硝西泮 B. 苯妥英钠
C. 苯巴比妥 D. 乙琥胺
E. 卡马西平
方正医学网答案：E

70. 医生问患者为什么住院了，患者答道：“我有2个孩子，红桃代表我的心，你放开手，是计算机病毒，保养自己……”，这属于什么症状
A. 思维奔逸 B. 病理性赘述
C. 刻板言语 D. 持续言语
E. 思维破裂
方正医学网答案：E

71. 患者，男，55岁。大量饮酒十余年，停止喝酒后2d出现走路不稳、四肢震颤，看到床上

有鱼、虾在跳，分不清方向，判断不了时间。头颅CT无异常。该患者最可能的诊断是
A. 癫痫所致精神障碍
B. 脑器质性精神障碍
C. 酒精性痴呆
D. 震颤谵妄
E. 精神分裂症
方正医学网答案：D

72. 患者，男，40岁。半年来反复发作心慌、胸闷、气促、濒死感，多次至急诊科就诊，各项身体检查未见异常。近1月来担心夜间发作而严重失眠。诊断为“焦虑症”，药物治疗首选
A. 苯二氮䓬类
B. 5-羟色胺重摄取抑制剂（SSRI）+苯二氮䓬类
C. 三环类抗抑郁药
D. SSRI类药物
E. 三环类抗抑郁药+SSRIs
方正医学网答案：B

73. 女，35岁。2个月前驾车发生重大交通事故致丈夫身亡，

自己轻伤。近 1 个月频繁噩梦，梦境中反复呈现车祸惨象，时常感到心悸不安。不敢看交通事故新闻，不敢再驾车。情感麻木，郁郁寡欢，该患者的诊断是

- A. 急性应激障碍
- B. 适应障碍
- C. 创伤后应激障碍
- D. 焦虑症
- E. 抑郁症

方正医学网答案：C

74. 为了解某地区铅污染的情况，抽样收集了 130 人的尿铅值，经分析发现数据为偏态分布。若要对数据进行描述，应选择集中趋势和离散程度的指标为

- A. 中位数和标准差
- B. 中位数和极差
- C. 中位数和四分位间距
- D. 算术均数和标准差
- E. 算术均数和四分位间距

方正医学网答案：C

75. 随机抽样调查甲乙两地正

常成年男子身高，得甲地身高的均值为 175cm，乙地为 179cm，经 t 检验得 $P < \alpha$ ，差别有统计学意义。其结论为

- A. 可认为两地正常成年男子平均身高相差不大
- B. 甲、乙两地正常成年男子身高均值相差较大
- C. 两地接受调查的正常成年男子平均身高不同
- D. 可认为两地正常成年男子平均身高不同
- E. 两地接受调查的正常成年男子平均身高差别较大

方正医学网答案：D

76. 欲用统计图比较 1994～2003 年城市和农村 3 岁以下儿童贫血患病率的变化趋势，选用何种统计图为合适

- A. 条图
- B. 线图
- C. 圆图
- D. 直方图
- E. 散点图

方正医学网答案：B

77. 在 1000 名病例与 1000 名对照的病例对照研究中。有 500

名病例和 200 名对照有暴露史，
OR 值应为
A. 1.4 B. 2.3
C. 4.2 D. 无法计算
E. 4
方正医学网答案：E

78. 男，45 岁。因反复咳嗽一个
月到社区卫生服务中心就诊。
医生与其交谈得知该患者已经
吸烟 20 多年。年前曾经尝试戒
烟一个月并得到家人的支持和
鼓励。家人对其的戒烟督促属于
影响行为的
A. 倾向因素 B. 促成因素
C. 强化因素 D. 内在因素
E. 诱导因素
方正医学网答案：C

79. 王女士，44 岁，体质指数为
 $27.1 \text{kg}/\text{m}^2$ ，她意识到自己体重
超重，打算通过运动控制体重，
但总是觉得没有适合自己的运动
方式，迟迟没有开始行动。
按照行为改变阶段理论划分，
王女士处于行为改变的
A. 行动阶段 B. 无打算阶段

C. 准备阶段 D. 打算阶段
E. 行为维持阶段
方正医学网答案：D

80. 患者，女，23 岁。食用自家
腌制的酱豆腐后出现胸闷、呼
吸困难、头晕，伴有恶心、呕
吐，血压 75/40mmHg，皮肤黏膜
呈青紫色。应考虑为
A. 亚硝酸盐食物中毒
B. 沙门菌食物中毒
C. 副溶血性弧菌食物中毒
D. 葡萄球菌肠毒素食物中毒
E. 肉毒梭菌毒素食物中毒
方正医学网答案：A

81. 医生在治疗过程中，把病人
当作自己患病的亲人，悉心照
料。该医生出现以上行为属于
A. 移情 B. 反移情
C. 同情 D. 亲情
E. 爱情
方正医学网答案：B

82. 男，22 岁，因为怕脏和反复
洗手等被诊断为强迫症。心理
治疗师要求患者触摸地面、门

把手等，之后不允许其洗手并要求其必须接着做事。经治疗，该患者的强迫症状逐渐减轻。

这种治疗方法属于

- A. 系统脱敏疗法
- B. 行为塑造
- C. 厌恶疗法
- D. 冲击疗法
- E. 逐级暴露疗法

方正医学网答案：D

83. 男，55岁，工程师，因膀胱癌入院准备接受手术治疗。在术前准备期间，患者一方面希望尽快恢复健康而配合各种检查和治疗，另一方面又担心自己主持的工程项目出问题而自行离院回单位开会。这种患者角色的状态属于

- A. 角色行为强化
- B. 角色行为异常
- C. 角色行为适应
- D. 角色行为缺如
- E. 角色行为冲突

方正医学网答案：E

84. 某医师因重大医疗事故受

到吊销医师执业证书的行政处罚。半年后重新申请执业注册，卫生行政部门未予批准。理由是该医师自处罚决定之日起至申请注册之日不满法定期限。该法定期限是

- A. 2年
- B. 3年
- C. 4年
- D. 1年
- E. 5年

方正医学网答案：A

85. 80岁老年患者，突发脑出血入院，急需手术签字，老伴受到惊吓精神恍惚，没有子女，此时正确的做法是

- A. 找医院负责人签字
- B. 找患者老伴签字
- C. 等患者老伴恢复正常后签字
- D. 写进病程记录后手术
- E. 找当地卫生局领导签字

方正医学网答案：A

86. 输血申请 1200ml 血量，上级医师已经同意，审批的领导为

- A. 科室主任
- B. 医务部门
- C. 质控部门
- D. 主任医师

E. 主治医师

方正医学网答案：A

87. 女，23岁。遵医嘱需肌内注射，在注射室内尚有男患者时，护士让该患者露出臀部进行注射，引起她的不满，护士则认为来看病就无须避嫌，该护士的观点和做法违背的伦理原则

- A. 公正原则
- B. 尊重原则
- C. 不伤害原则
- D. 公益原则
- E. 有利原则

方正医学网答案：B

88. 下列选项中符合手术治疗伦理要求的是

- A. 手术方案应当经患方知情同意
- B. 患者坚决要求而无指征的手术也可实施
- C. 手术对患者确实有益时，可无需患者知情同意
- D. 手术方案必须经患者单位同意
- E. 患者充分信任时，医生可自行决定手术方案

方正医学网答案：A

89. 医学道德评价的首要标准是：是否有利于

- A. 患者疾病的缓解和康复
- B. 医疗机构的发展
- C. 人类生存和环境保护及改善
- D. 医学科学发展和社会进步
- E. 医务人员社会地位的提升

方正医学网答案：A

90. 男，65岁。急性前壁心肌梗死3小时。既往有高血压、糖尿病史。平时血压(140~150)/(70~80)mmHg。查体：BP90/70 mmHg，双肺呼吸音清，心率85次/min，律齐。该患者血压降低的最可能原因是

- A. 主动脉壁硬化
- B. 大动脉弹性降低
- C. 心脏每搏输出量降低
- D. 心率降低
- E. 外周阻力降低

方正医学网答案：C

91. 某女中学生，在晚上遭遇一条白犬，当时十分恐惧，表现出心率加快、血压增高、呼吸

加速和肌张力增强，这些生理反应说明活动增强的神经内分泌系统是

- A. 下丘脑垂体-甲状腺轴
- B. 下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴
- C. 交感-肾上腺髓质轴
- D. 下丘脑-垂体-性腺轴
- E. 下丘脑-神经垂体轴系

方正医学网答案：C

92. 肺结核属于几型超敏反应

- A. I 型超敏反应
- B. II 型超敏反应
- C. III 型超敏反应
- D. IV 型超敏反应
- E. V 型超敏反应

方正医学网答案：D

93. 关于肝硬化的叙述中正确的是

- A. 亚急性重症型病毒性肝炎多发展为门脉性肝硬化
- B. 病变特点是肝细胞坏死、纤维组织增生和假小叶形成
- C. 门脉高压症可表现为出血倾向
- D. 肝功能不全可表现为脾大

E. 肝硬化不发生癌变

方正医学网答案：B

94. 患儿，8岁，因眼睑和全身水肿就诊。尿蛋白 (++++)，24小时尿蛋白定量 5.2g，血浆白蛋白 20g/L。肾穿刺活检病理报告最可能的是

- A. 光镜下肾小球系膜区广泛 IgA 沉积
- B. 光镜下见部分肾小球节段性硬化
- C. 光镜下肾小球基本正常，肾小管上皮细胞内有脂质空泡
- D. 光镜下肾小球内皮细胞和系膜细胞增生
- E. 光镜下肾小球毛细血管基底膜增厚，钉突形成

方正医学网答案：C

95. 女，46岁，上腹部不适1年，加重伴头晕，乏力2月，多为进餐前疼痛，既往患有桥本甲状腺炎病史10年，胃镜见胃黏膜变薄，黏膜色泽变淡，可透见血管型。最可能出现的胃病类型是

A. A 型胃炎

B. B 型胃炎

C. 穿透性胃溃疡

D. 慢性浅表性胃炎

E. 胃癌

方正医学网答案：A

96. 男，22岁，乏力，纳差1个月，水肿少尿伴血压升高1周，尿蛋白(++)，尿RBC30~50/HP，血Hb76g/L，补体C3正常，肌酐421μmol/L，B超提示双肾增大，血清抗肾小球基底膜抗体阳性，最可能的诊断是

A. 急进性肾小球肾炎Ⅱ型

B. 急性肾小球肾炎

C. 急进性肾小球肾炎Ⅲ型

D. 急进性肾小球肾炎Ⅰ型

E. 急性肾小管坏死

方正医学网答案：D

97. 男，68岁。活动后心悸、气短4年，突发憋喘1小时来诊，高血压病史10年余，平时血压波动于130~150/70~90mmHg。查体：BP230/100mmHg，端坐位，

双肺底可闻及少量湿性啰音，心率114次/分。该患者最适宜的治疗是

A. 口服阿替洛尔

B. 口服硝苯地平

C. 口服哌唑嗪

D. 肌注利血平

E. 静脉滴注硝普钠

方正医学网答案：E

98. 男，82岁。1天来排黑便2次，每次量约50g。近1个月口服小剂量阿司匹林。查体：腹软，腹部无压痛，未触及包块，肝脾未触及。首选的治疗药物是

A. 止血芳酸

B. 生长抑素

C. 铝碳酸镁

D. 法莫替丁

E. 奥美拉唑

方正医学网答案：E

99. 参与构成蛋白质合成场所的RNA是

A. 信使RNA

B. 核糖体RNA

C. 核内小RNA

D. 催化性RNA

E. 转运 RNA

方正医学网答案：B

100. 女，35岁。来医院健康体检。查体：BP130/80mmHg。身高165cm，体重75kg，肝脾肋下未触及。实验室检查：ALT75U/L，AST40 U/L，Y-GT40U/L。B超：

中度脂肪肝。该患者肝内蓄积的甘油三酯的主要来源是

- A. 小肠细胞合成
- B. 生酮氨基酸转变
- C. 肝细胞合成
- D. 脂肪组织转运
- E. 脂肪组织分解

方正医学网答案：C



方正教育

FZ EDUCATION